



A Joint Australian Government & State/Territory Health Initiative

Khmer



តើអ្នកបានធ្វើតេស្តដាច់ស្បែក ចុះក្រោយបំផុតនាពេលណា?

ជម្ងឺមហារីកកស្បែកភាគច្រើនអាចដឹង បង្ការបាន ប្រសិនបើស្រ្តីម្នាក់ៗ បានធ្វើតេស្តដាច់ស្បែក (Pap Smear) នៅរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង

National Cervical Screening Program

DON'T MAKE EXCUSES, MAKE AN APPOINTMENT


តើអ្វីទៅជាដាច់ស្បែក?

ដាច់ស្បែកគឺជាតែសងាយស្រួលមួយ ដើម្បីពិនិត្យមើលសុខភាព កស្បែក(មាត់ច្រកស្បែក)។ គេត្រូវការពេលវេលាតែប៉ុន្មាននាទី ប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនធ្វើឲ្យឈឺចាប់អ្វីទេ។ តែសនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុត ដើម្បីរកឲ្យឃើញ ព្រមទាំងការពារជម្ងឺមហារីកកស្បែក។

ហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើតេស្តដាច់ស្បែក?

តែសដាច់ស្បែកអាចបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសញ្ញាដឹងជាមុន ពីមហារីកកស្បែក។ កស្បែករបស់អ្នកនៅខាងក្នុងយោនី ដែលជាមាត់ច្រកនៃស្បែករបស់អ្នក។

ជួនកាលកោសិកាតូចៗ នៃកស្បែកចាប់ផ្តើមប្តូរពី ភាពធម្មតា ទៅភាពមិន ប្រក្រតី។ ភាពនេះអាច កើតឡើងដោយអ្នកមិនដឹង ខ្លួនផង។ កោសិកាដែលខុសប្លែកពី ធម្មតាទាំងនេះអាចព្យាបាល បានដោយវេជ្ជបណ្ឌិត មុន គឺឯវាក្លាយទៅជាមហារីក។




មហារីកកស្បែកដែលកើតជាទូទៅ នោះអាចជៀសវាងបាន រហូតដល់ទៅ៩០ភាគរយ ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរកោសិកាដ៏ប្លែក ត្រូវបានគេរកឃើញ ហើយព្យាបាលបានទាន់ពេល។

តើអ្នកណាត្រូវការធ្វើតេស្តដាច់ស្បែកនេះ?

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានសេពកាម អ្នកត្រូវធ្វើតេស្តដាច់ស្បែកនេះ រៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង។ ស្រ្តីគួរតែធ្វើតេស្តដាច់ស្បែកឲ្យបានទៀងទាត់ រហូតដល់អាយុ ៧០ឆ្នាំ។

តើគេធ្វើតេស្តដាច់ស្បែកដោយរបៀបណា?



គេធ្វើដូចគេទៅនេះ...

ជាដំបូង វេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់អ្នកឲ្យដោះសំលៀកបំពាក់ចេញ ចាប់ពីចង្កេះចុះក្រោម ហើយឲ្យដេកផ្ទាល់ ដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យ មើល។ អ្នកអាចស្នើសុំវេជ្ជបណ្ឌិតស្រីបាន។ បន្ទាប់មក វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រើគ្រឿងប្រដាប់ពេទ្យម្យ៉ាងហៅថា ស្ពេយ្យូឡូម ឬប្រដាប់សំរាប់វែក (Speculum) ដើម្បីបើក យោនី។ គេប្រើកូនច្រាស ឬបន្ទះឈើ ឬជ័រតូចមួយដើម្បី កៀរយ៉ាងស្រាលៗយកកោសិកាខ្លះពីកស្បែក។ គេដាក់កោសិកាទាំងនេះនៅលើកូនបន្ទះកញ្ចក់មួយ ហើយ ផ្ញើទៅមន្ទីរពិសោធន៍ ដែលនៅទីនោះគេពិនិត្យ មើលកោសិកាទាំងនោះតាម អតិសុខុមទស្សន៍ (Microscope)។



ចំណែកលទ្ធផលនោះវាយ៉ាងណាដែរ?

នៅពេលអ្នកធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀង នេះគឺជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវសួរវេជ្ជបណ្ឌិតថាតើពេលណា និងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកបានដឹងអំពីលទ្ធផល។

លទ្ធផលភាគច្រើន មានភាពងាយស្រួល។

ចុះប្រសិនបើលទ្ធផលមានភាពមិនប្រក្រតីទេ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរ?

ប្រសិនបើលទ្ធផលនោះមិនមានភាពធម្មតា នេះមិនមែនបានសេចក្តីថាអ្នកកើតជម្ងឺមហារីកទេ។

វាប្រហែលជាមានន័យថា អ្នកមានការរោគសាមញ្ញដែលវេជ្ជបណ្ឌិតអាចព្យាបាលបាន។

គឺជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអំពីលទ្ធផលនោះ ព្រមទាំងអំពីវិធីព្យាបាលដែលអ្នកត្រូវទទួល។

តើបន្ទាប់មកទៀតត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?

ជួនកាល ស្ត្រីប្រហែលជាត្រូវការធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀងឲ្យបានញឹកញាប់។ ស្ត្រីខ្លះទៀតប្រហែលជាត្រូវទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស។ ប្រសិនបើមានកោសិកាមិនប្រក្រតី គេនឹងព្យាបាលកោសិកានោះ។

អ្នកត្រូវនិយាយឲ្យបានច្បាស់ ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអំពីការព្យាបាលដែលល្អសមស្របសំរាប់អ្នក។

ខ្ញុំដល់ពេលអស់រដូវ (Menopause) ហើយ តើខ្ញុំនាំត្រូវធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀង?

អ្នកត្រូវធ្វើតេស្ត ពីព្រោះគ្រោះថ្នាក់កើតមហារីកកស្យុងមានកាន់តែខ្លាំង នៅពេលអ្នកមានអាយុកាន់តែច្រើន។ ហេតុដូច្នោះនេះគឺជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀងរៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង ទោះបីជាអ្នកអស់រដូវរួចរាល់ក៏ដោយ។

ខ្ញុំបានកាត់ស្បូនចេញ (Hysterectomy) រួចហើយ តើខ្ញុំនាំត្រូវធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀង?

អ្នកប្រហែលជានៅតែត្រូវធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀងដែល។ សូមនិយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។

ខ្ញុំសំគាល់ឃើញមានធាតុឈាមមិនប្រក្រតីខ្លះៗ

ប្រសិនបើអ្នកមានធាតុឈាមមិនធម្មតា ឬមានធាតុរំលាយស្បូន (Discharge) ពីហោតី សូមទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកជាបន្ទាន់។

តើការធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀងសម្រាប់ខ្ញុំឬទេ?

វេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរព្យាបាល និងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពខ្លះធ្វើជាប់ស្បៀងអ្នកដោយពុំគិតថ្លៃឡើយ។ កន្លែងខ្លះទៀតតម្រូវឲ្យអ្នកបង់ថ្លៃ។ សូមអ្នកសួរតម្លៃជាមុនសិន មុននឹងអ្នកធ្វើការណាត់ពេលជួបមួយ។ សូមជ្រើសរើសយកទីកន្លែងណាមួយដែលងាយស្រួលទៅមក ហើយដែលអ្នកមានលទ្ធភាពអាចបង់ថ្លៃបាន។

ខ្ញុំមិនចាំពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀងចុះក្រោយ

វេជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលអ្នក ប្រហែលជាមានប្រព័ន្ធសំរាប់រំលឹកប្រាប់អ្នកពីពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀងលើកក្រោយ។

នៅតាមរដ្ឋ ឬដែនដីមួយៗ គេមានរបៀបកត់ចូលបញ្ជីនូវលទ្ធផលតេស្តជាប់ស្បៀងរបស់អ្នក។ ភាពសម្ងាត់នៃព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវបានច្បាប់ការពារ។

អ្នកកាន់បញ្ជី គឺជាអ្នកជួយរំលឹកប្រសិនបើពេលធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀង ឬការព្យាបាលរបស់អ្នកហួសថ្ងៃកំណត់។

ប្រសិនបើអ្នកមិនបង់ឲ្យគេកត់ព័ត៌មានចូលក្នុងបញ្ជីទេ សូមនិយាយប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងណា ដើម្បីធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀង?

ស្ត្រីខ្លះមានការខ្វះខាតអំពីការធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀងនេះ។ វាប្រហែលជាជួយឲ្យអ្នកមិនខ្មាស់រឿង ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមនុស្ស និងទីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រួលចិត្តនឹងទៅជួបគេ។

អ្នកអាចធ្វើការណាត់ពេលជួបមួយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកគឺលាងប្រដាប់ភេទ ឬមន្ទីរគ្រោះថ្នាក់គ្រួសារ (Family Planning Clinic) នៅក្នុងដំបូងដែលអ្នករស់នៅ។ អ្នកអាចស្នើសុំវេជ្ជបណ្ឌិតស្រីម្នាក់ ដើម្បីឲ្យគេធ្វើតេស្តជាប់ស្បៀងជូនអ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមិនបង់បានអ្នកបកប្រែភាសាឲ្យជួយអ្នកនៅពេលនោះ សូមប្រាប់គេឲ្យដឹងនៅពេលធ្វើការណាត់ជួប។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមទៀត ស្នើអំពីកិច្ចការពារជម្ងឺមហារីកកស្យុង សូមទូរស័ព្ទលេខ **13 15 56** (ដោយបង់តម្លៃទូរស័ព្ទដូចក្នុងដំបូង)។

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាពិបាកក្នុងការទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេស សូមទូរស័ព្ទទៅកិច្ចបកប្រែភាសាអត់បទ និងភាសានិយាយ (Translation and Interpreting Service) លេខ **13 14 50** ដើម្បីសុំជំនួយ។ អ្នកត្រូវបង់តម្លៃទូរស័ព្ទ ដូចថ្លៃទូរស័ព្ទក្នុងដំបូង។

www.cervicalscreen.health.gov.au



A joint Australian Government & State/Territory Health initiative