



NSW SEXUAL HEALTH SERVICES
Providing free and confidential
sexual health care.

ការប្រើស្រោមលីង


១. ចូរអ្នកពិគ្រោះជាមួយគូស្នេហាជាមុន អំពី
ការប្រើស្រោមលីង។




២. ចូរពិនិត្យនៅលើកញ្ចប់ មើលថ្ងៃខែដែល
ស្រោមលីងត្រូវទូច ប្រើមិនបាន។




៣. ចូរសាកល្បងប្រើស្រោមលីងជាមុន។
ចូរ សាកម៉ាកផ្សេងៗ ជ្រើសរើសរកទំហំ
អោយបានត្រឹមត្រូវ។



៤. ចូរពាក់ស្រោមលីង មុននឹងសេពកាម។
ប្រយ័ត្នកុំអោយឆ្គួតជាប់រហែក ដោយសារ
ចិញ្ចៀន វីក័ក្រចកដៃ។



៥. ចូរច្នៃស្រោមអោយទៅដល់គល់លីង។



៦. ចូរកាន់ទប់គល់ស្រោម នៅពេលដែល
អ្នកដកលីងចេញពីយោនី ។



៧. ចូរប្រើធាតុរំលិលដែលមានជាតិទឹក ដូចជា
ម៉ាក យីចេល្លី វីក័វេតស្តារ។ ជៀសវាងកុំ
ប្រើធាតុរំលិលដែលមានជាតិប្រេង ដូចជា
ខ្លាញ់វ៉ាសាលីន វីក័ប្រេងទារក(ជាតិប្រេង
នេះ ធ្វើអោយទូចស្រោមកៅស៊ូ) ។

៨. ចូរចោលស្រោមលីងក្នុងធុងសំរាម
កុំចោលក្នុងបង្គន់។

កន្លែងនេះផ្តល់ដោយ
គណៈកម្មការជាតិទីព្រឹក្សា
ខាងជំនីរេភា។

Albury	Ph: (02) 6058 1831
Balranald	Ph: (03) 5027 2345
Bourke	Ph: (02) 68722145
Broken Hill	Ph: (08) 8088 5800
Canterbury	Ph: (02) 9718 7655
Coffs Harbour	Ph: (02) 6659 1916
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3470
Katoomba	Ph: (02) 4780 6060
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 68291022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6361 9906
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4724 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6551 1315
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

ហឹបពីសនៅអង្គជាតិ
Genital Herpes



និង ផ្នែកសិក្សានៃវេជ្ជសាស្ត្រខាងសុខភាពនៃការសេពកាម
សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី/សាកលវិទ្យាល័យញ៉ូសោធរស

ហិបតិសបណ្តាលមកពីមេរោគវីរុសដែលគេហៅថាហិបតិសស៊ីមផ្តេច។ មេរោគវីរុសហិបតិសស៊ីមផ្តេចនេះមានពីរប្រភេទ ៖

- ប្រភេទទីមួយ ជាធម្មតាច្រើនកើតនៅបច្ចុប្បន្ន ហើយដែលគេចូលចិត្តហៅថាដំបៅមាត់។
- ប្រភេទទីពីរ ច្រើនកើតនៅជុំវិញអង្គជាតិ (លើដីរឹង) និងរន្ធក្នុង ។

ប្រភេទណាមួយក៏អាចកើតនៅត្រង់កន្លែងទាំងពីរនេះដែរ ហើយអាច ឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត ដូចជារន្ធក្នុង ត្រប់ក្នុង ប៉ុន្តែកំរិតខ្ពស់ទៅដល់ភ្នែកណាស់។ នៅពេលដែលគេកើតហិបតិសស៊ីមផ្តេចហើយនោះ រោគនេះធ្វើដំណើរចូលទៅសរសៃ ដែលប្រទាក់ជាប់ទៅនឹងកន្លែងដ៏ជ្រៅ ហើយសំងំនៅទីនោះ។ ក្រោយមក វីរុសនេះអាចមានសកម្មភាពឡើងវិញ ហើយធ្វើដំណើរតាមសរសៃ ទៅដាំអោយកើត ជាដំបៅមាត់ទៀត។

តើរោគនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ហិបតិសនៅអង្គជាតិ អាចបណ្តាលអោយមានជំងឺទាំងនឹងរាងកាយ ប្រសិនគ្មានការព្យាបាលទេនោះ។ ប៉ុន្តែសភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាច្រើន ហើយចំពោះជនខ្លះទៀត រោគសញ្ញាមានត្រឹមសភាពស្បើបតែប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះដំណាក់កាលដែលរោគនេះរីករាលដាលឡើងវិញនោះជំងឺនេះមិនជាធ្ងន់ធ្ងរ ហើយយូរដូចមុនទេ ។

ហិបតិសស៊ីមផ្តេចនេះអាចបង្កជាជំងឺទឹកខ្លះនៅក្បែរដំណើរអង្គជាតិ។ ធម្មតាពងខ្លះនេះធ្វើអោយឈឺចុក ហើយស្បែកនៅមុំនោះឡើងពណ៌ក្រហម។ ក្នុងរយៈពេលដំបូង ចំនួនពងខ្លះនេះមិនទៀង អាចមានពីមួយវិញរហូតដល់ទៅរាប់មួយ។ ពងខ្លះទាំងនេះនឹង បែក ហើយក្លាយទៅជាដំបៅសើម ដែលនៅទីបំផុតនឹងជាសះ។ ការជាសះដ៏ជ្រៅនេះច្រើនតែកើតឡើងជាមួយការរមាស់។ អ្នកជំងឺខ្លះមានអាការរោគផ្សេងៗមួយចំនួន មុននឹងកើតរោគនេះម្តងទៀត ។ រោគសញ្ញាទាំងនោះមានដូចជា ការឈឺធ្មេញ (ដូចម្ហូបចាក់) ឈឺសរសៃសស្គ រមាស់ ភាពមិនស្រួលខ្លួន និងការទិញម្ហូប ដែល អាចមានរយៈពេលពីររយៈទៅរយៈបីថ្ងៃ មុននឹងរោគនេះរីករាលដាលជាសះស្បើយពីការឈឺធ្មេញឡើងវិញនេះ ប្រហែលជា៦ទៅ៧ថ្ងៃ ។

តើគេទទួលរោគនេះតាមវិធីណា?

វីរុសហិបតិសស៊ីមផ្តេចអាចឆ្លង ដោយសារការប៉ះកកិតស្បែកជាមួយអ្នកដែលមានដំបៅក្លាយនេះ។ ជាធម្មតា ការឆ្លងរោគនេះច្រើនតែកើតឡើង នៅពេលសេពកាមតាមយោធិ រន្ធក្នុង និងប្រអប់មាត់។ ប៉ុន្តែរោគនេះនៅតែអាចឆ្លងបាន ប្រសិនបើមានការប៉ះកកិតស្បែក ហើយទោះបីជាគ្មានការសំរុកខ្លាំងក្នុងការសេពកាមយ៉ាងណាក៏ដោយ។

គេមានអែកសារច្រើនណាស់ ដែលស្តីអំពីការឆ្លងរោគនេះ ពីបុគ្គលម្នាក់ដែល មានរោគសញ្ញាជាក់ច្បាស់ ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀត។ ប៉ុន្តែមានជនច្រើនណាស់ ដែលមិនដឹងថាខ្លួនមានរោគហិបតិសស៊ីមផ្តេចនេះ ដោយសារគេគ្មានរោគ សញ្ញាអ្វីសោះ រីក៏មានដែរ ប៉ុន្តែគិតត្រឹមពេកមិនចាប់អារម្មណ៍។

តើរោគសញ្ញានឹងចេញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន?

ធម្មតា រោគសញ្ញានឹងចេញជាដំបូង ក្នុងរយៈពេលពី២ទៅ២០ថ្ងៃក្រោយពីការឆ្លងរោគ។ ប៉ុន្តែជួនកាលរោគសញ្ញាទាំងនោះមិនលិចចេញ រហូតដល់រាប់ខែ រឺឆ្នាំក៏មាន។

តើហិបតិសនេះរីកឡើងញឹកញាប់បែបណាដែរ?

ការឡប់រលើរីករាលដាលកើតឡើងចំពោះមនុស្សភាគច្រើន ប៉ុន្តែមិនគ្រប់ៗគ្នាទាំងអស់ទេ ហើយអាចរីកឡើងរាប់ឆ្នាំក្រោយមកក៏មាន។ ចន្លោះពេលរវាងការរីកឡើងវិញនេះ ច្រើនយោលទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ៗ។ ដំបៅក្លាយហិបតិសប្រភេទទីមួយនៅដំបូងអង្គជាតិ និងក្នុង មិនសូវឡប់រលើឡើងវិញជាញឹកញាប់ដូចដំបៅក្លាយពីហិបតិសប្រភេទទីពីរទេ ។ ប្រហែលគ្នាដែរនោះ ដំបៅក្លាយហិបតិសប្រភេទទីពីរនៅមាត់ ក៏មិនសូវឡប់រលើឡើងវិញជាញឹកញាប់ដូចដំបៅក្លាយពីហិបតិសប្រភេទទីមួយដែរ។

ហេតុអ្វីបានជាការឡប់រលើវិញនេះកើតឡើង?

ការឡប់រលើនេះ កើតឡើងនៅពេលដែលវីរុសដែលសំងំនៅក្នុងសរសៃចាប់មានសកម្មភាពឡើងវិញ។ ចំពោះជនភាគច្រើន ការឡប់រលើវិញនេះហាក់ដូចជាពុំមានលំនាំអ្វីអោយច្បាស់លាស់ទេ។ ខ្លះកត់សំគាល់ឃើញថាការឡប់រលើវិញនេះកើតឡើងនៅពេលដែលគេចិតសិនមានរដូវ អស់កំលាំង ចិត្តគោរព និងរលាកខ្លួននិងកំដៅថ្ងៃ រីក៏ពេលដែលគេសេព ត្រៀមស្រវឹងច្រើនជ្រាល ។

តើគេអាចបន្ថយការឆ្លងដំបៅក្លាយ ហិបតិសស៊ីមផ្តេចទៅដៃគូសេពកាមតាមវិធីណា?

ចាប់តាំងពីពេលមានអាការរោគប្រដ្ឋិម (ការឈឺក្រហាយ ភាពរមាស់ ការឈឺធ្មេញនៅចំ រីនៅក្បែរដំបៅ)នៅដល់ពេលដែលដំបៅបានជាសះ គេអាចចំលងមេរោគនេះតាមការកកិតស្បែកនៅត្រង់ដំបៅ។ នៅពេលនេះ គេគួរជៀសវាងការសេពកាម។ ការប្រើស្រោមលើដំបៅជាដិច្ចជាកាលអាចបន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់ពីការឆ្លងរោគ ជាពិសេស ពីអ្នកដែលគ្មានរោគសញ្ញាអោយច្បាស់។ គេគួរប្រើស្រោមលើដំបៅ ជាមួយគូសេពកាមថ្មី រីក៏គូសេពកាមម្តង ម្កាល -នេះនឹងជួយការពារមិនអោយមានគ្រោះថ្នាក់ពីរោគកាមរីកឡើងផងដែរ ។

តើរោគហិបតិសនេះអាចធ្វើមិនអោយមានកូនដែររឺទេ?

វីរុសហិបតិសស៊ីមផ្តេចនេះមិនមែនដឹកនាំដោយទឹកកាមទេ ដូច្នេះរោគនេះគ្មានការទាក់ទងអ្វីជាមួយនឹងការមាន រឺគ្មានកូននោះឡើយ។ ការឈឺធ្មេញឡើងវិញនៅពេលគេមានភ័ក កំរិតនិងប៉ះពាល់ដល់ទារក ដែលនៅក្នុងស្បូនណាស់។ ប៉ុន្តែដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺនេះនៅពេលមានភ័ក អាចនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយគេត្រូវទាក់ទងគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់។ ស្ត្រីទាំងនេះគួរប្រាប់គ្រូពេទ្យរឺក៏អោយដឹងថាគេមានកើតហិបតិសនៅអង្គជាតិ ក្រែងលោមានការឈឺធ្មេញនៅពេលបង្កើតកូន។ ក្នុងករណីនេះ គេគួររំលងកូនតាមការវះកាត់ ដើម្បីជៀសវាងកុំអោយហិបតិសឆ្លងទៅកូនទ្វីបាន ។

តើគេមានការព្យាបាលសំរាប់ហិបតិសនេះដែររឺទេ?

ចំពោះអ្នកដែលទើបតែកើតហិបតិសជាលើកដំបូង រីក៏អ្នកដែលមានការឈឺធ្មេញជាញឹកញាប់ រីក៏ធ្ងន់ធ្ងរ គេអាចផ្លាស់ប្តូរដែលអាចសាកសិទ្ធិ ឈ្មោះថាអាស៊ីក្លូវីន (Acyclovir)។ ការលេបថ្នាំនេះជាប់លាប់នឹងជួយបន្ថយចំនួននិងរយៈពេលនៃការឈឺធ្មេញឡើងវិញ។ អាស៊ីក្លូវីនមានប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្តែមិនអាច "កំចាត់"រោគហិបតិសបានឡើយ ។ ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត សូមទាក់ទងនឹងគ្រូពេទ្យរឺក៏គិលានុដ្ឋាយិកា។

តើអាវាទអ្វីខ្លះដែលគេអាចអោយទៅអ្នកជំងឺនេះ?

- ជនទាំងអស់ ដែលមានមន្ទិលថាគេនឹងកើតរោគហិបតិសស៊ីមផ្តេចនេះជាលើកទីមួយ គួរតែទៅរកគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់។ ការបញ្ជាក់អោយច្បាស់ថានេះជារោគហិបតិសពិតប្រាកដហើយ ក៏ជាការសំខាន់ដែរ។
- ចូរថែដំបៅអោយបានស្អាតនិងអោយស្ងួត ដោយពងនិងទឹកប្រៃហើយទុកអោយស្ងួតត្រឹមត្រូវ ម្តងវិញនិងក្នុងមួយថ្ងៃ។
- ថ្នាំអាស៊ីរីន (Aspirin) ប៉ារ៉ាស៊ីតាម៉ុល (Paracetamol) រីក៏ក្រមួនស្លឹកអាចជួយមិនអោយដំបៅឈឺចាប់ពេក។
- ការសំរប់សំរួលទៅតាមហិបតិសជាលើកដំបូងអាចជាការលំបាក។ ការពិគ្រោះជាមួយទីប្រឹក្សា មិត្តភក្តិ រីក៏គូស្នេហាអាចជួយសំរួលបញ្ហានេះ។

តើគេអាចបន្ថយចំនួនការឈឺធ្មេញឡើងវិញ តាមវិធីណា?

ចំពោះជនដែលចេះតែមានការឈឺធ្មេញឡើងវិញ គេគួរតាមសង្កេតរកមើលកត្តាដែលបណ្តាលអោយមានការឈឺធ្មេញឡើងវិញនេះ ហើយខិតខំជៀសវាងកត្តាទាំងនោះ(សូមអានខាងលើ)។ ប្រសិនបើវិធីនេះពុំបានជោគជ័យទេនោះ គេគួរតែពិគ្រោះរិះរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតជាមួយគ្រូពេទ្យ។ មណ្ឌលសុខភាពខាងសេពកាមស៊ីដឺនីក៏មានក្រុមជំនួយខាងហិបតិសនេះដែរ ។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម ចូរអ្នកពិគ្រោះជាមួយទីប្រឹក្សា តាមទូរស័ព្ទលេខ ០២ ២២៣ ៧០៦៦។