



NSW SEXUAL HEALTH SERVICES
 Providing free and confidential
 sexual health care.

ការប្រើស្រោមលិង


១. ចូរអ្នកពិគ្រោះជាមួយគូរស្នេហាជាមុន អំពី
 ការប្រើស្រោមលិង។




២. ចូរពិនិត្យនៅលើកញ្ចប់ មើលថ្ងៃខែដែល
 ស្រោមលិងត្រូវទូច ប្រើមិនបាន។




៣. ចូរសាកល្បងប្រើស្រោមលិងជាមុន។
 ចូរ សាកម៉ាកផ្សេងៗ ជ្រើសរើសរកទំហំ
 អោយបានត្រឹមត្រូវ។




៤. ចូរពាក់ស្រោមលិង មុននឹងសេពកាម។
 ប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកដាច់រំហែក ដោយសារ
 ចិញ្ចៀន វីក័ក្រចកដៃ។



៥. ចូរច្យុតស្រោមអោយទៅដល់គល់លិង។



៦. ចូរកាត់ទប់គល់ស្រោម នៅពេលដែល
 អ្នកដកលិងចេញពីយោនី ។



៧. ចូរប្រើធាតុរំលិលដែលមានជាតិទឹក ដូចជា
 ម៉ាក យីចេល្លី វីក័ក្រចក។ ជៀសវាងកុំ
 ប្រើធាតុរំលិលដែលមានជាតិប្រេង ដូចជា
 ខ្លាញ់វ៉ាសាលីន វីក័ក្រចកទារក(ជាតិប្រេង
 នេះ ធ្វើអោយទូចស្រោមកៅស៊ូ) ។

៨. ចូរចោលស្រោមលិងក្នុងធុងសំរាម
 កុំចោលក្នុងបង្គន់។

គំនូរនេះផ្តល់ដោយ
 គណៈកម្មការជាតិទីព្រឹក្សា
 ទាងជំងឺអេដស៍។

Albury	Ph: (02) 6058 1831
Balranald	Ph: (03) 5027 2345
Bourke	Ph: (02) 68722145
Broken Hill	Ph: (08) 8088 5800
Canterbury	Ph: (02) 9718 7655
Coffs Harbour	Ph: (02) 6659 1916
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3470
Katoomba	Ph: (02) 4780 6060
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 68291022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6361 9906
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4724 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6551 1315
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

រោគសាច់រឹសអង្គជាតិ
Genital Wart Virus Infection



និង ផ្នែកសិក្សានៃវេជ្ជសាស្ត្រខាងសុខភាពនៃការសេពកាម
 សាកលវិទ្យាល័យស៊ីធីឌី/សាកលវិទ្យាល័យញ៉ូសោធវេល

រោគសាច់រឹសអង្គជាតិ (និងគូថ) បណ្តាលមកអំពីមេរោគវ៉ាយរីសប៉ាពីឡូម៉ា មួយចំនួន ដែលស្ថិតនៅត្រង់អង្គជាតិ និងគូថ។ គេសន្មត់ថា វ៉ាយរីសទាំងនោះចូលចិត្តទីកន្លែងក្តៅអ៊ុនៗ និងសើម។ វ៉ាយរីសដំបៅរឹស មានប្រមាណជាជាង៧០ប្រភេទ ដែលអាចកើតមាននៅទីផ្សេងៗនៃរាងកាយ។

- រោគដំបៅរឹសអង្គជាតិ អាចលេចចេញជារូបរាង ដូចខាងក្រោមនេះ :
- រឹសដែលគេមើលឃើញ ដែលអាចមាននៅម្តុំអង្គជាតិ រឹក៏គូថ។
 - ដំបៅដែលគ្មានរូបរាងអោយងាយឃើញ - គេមើលរឹសនេះពុំឃើញទេ។ ប៉ុន្តែដោយប្រើវិធីស្រាវជ្រាវស្រាវ គេអាចដឹងថា មានវ៉ាយរីស(ធម្មតាតាមរយៈការវិភាគបំបែកប៉ាប់ស្លៀ (Pap smear រឹក៏បាយអុបស៊ី (biopsy))។
 - រោគដំបៅដែលនៅសំដីមិនទាន់ចេញអោយឃើញ-គេអាចឃើញមេរោគនេះកើត ដោយប្រើវិធីក្នុងមន្ទីរពិសោធ ដែលគេសំរាប់ទុកសំរាប់តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

តើគេទទួលរោគដំបៅនេះតាមវិធីណា?

សាច់រឹសដែលគេមើលឃើញ ច្រើនតែឆ្លងតាមការសេពកាម ហើយជាធម្មតា រោគនេះនឹងលេចចេញរូបរាង ក្នុងរយៈពេលពី១ខែទៅ១២ខែ។ គេយល់ថា រោគដំបៅដែលគ្មានរូបរាងអោយងាយឃើញ ក៏ប្រហែលជាឆ្លងតាមបែបនេះដែរ ប៉ុន្តែ ការស្រាវជ្រាវមកទល់ពេលនេះ ពុំទាន់ចេញជាលទ្ធផលអោយច្បាស់លាស់ទេ។

តើការព្យាបាលមានអ្វីខ្លះដែរ?

ដោយសាររោគសាច់រឹសនេះបណ្តាលមកអំពីមេរោគវ៉ាយរីស ការព្យាបាលបានត្រឹមតែវះកាត់យករឹស រឹក៏កោសិកាដែលទួចនេះចេញ ។ ប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ថា គេអាចកំចាត់មេរោគវ៉ាយរីសនេះកើតឡើយ។ គេអាចកាត់រឹសនេះចេញ ដោយប្រើថ្នាំប៉ូដូហ្វីតូតិកស៊ីន រឺ ប៉ូដូហ្វីតូតិកស៊ីន (podophylotoxin) (ធាតុរាវ) ការធ្វើអោយកក ការដុតសាច់រឹស រឹក៏ប្រើការស្ទីលេស័រ (laser)។ ជាធម្មតា សាច់រឹសនេះអាចដុះឡើងវិញទោះបី ជាគេព្យាបាលបែបណាក៏ដោយ។ ជួនកាល

គេព្យាបាលសាច់រឹស ដែលគ្មានរូបរាង នៅកស្សនស្រ្តី។ ក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងពិគ្រោះអំពីវិធី ព្យាបាលដែលត្រឹមត្រូវបំផុត។

តើមេរោគវ៉ាយរីសប៉ាពីឡូម៉ា អាចបណ្តាលអោយកើតមហារីកដែររឺទេ?

មេរោគវ៉ាយរីសនៃសាច់រឹសអង្គជាតិមួយចំនួន មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការប្រែប្រួលផ្នែកៗនៃកោសិកានៅត្រង់កស្សនស្រ្តី លិង រឹក៏គូថ។ ប៉ុន្តែមានមេរោគវ៉ាយរីសចំនួនតិចតួចណាស់ ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងមហារីក។ ទំនាក់ទំនងនេះហាក់ដូចជាភ្ជាប់ទាក់ទៅនឹងកត្តាផ្សេងទៀត ដូចជាការជក់បារី។ សាច់រឹសដែលគេមើលឃើញ ប្រហែលជាមិនអាចបណ្តាលអោយកោសិកាប្រែប្រួល ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មុនជំងឺមហារីក។ ប្រភេទវ៉ាយរីសនៃសាច់រឹស ដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រែប្រួលខុសពីសព្វដងនៃកោសិកា ច្រើនតែនាំអោយទៅជារោគដំបៅដែលគ្មានរូបរាងអោយងាយឃើញ។

តើរោគនេះអាចឆ្លងទៅតួសេពកាមដែររឺទេ?

សាច់រឹសដែលគេមើលឃើញ អាចឆ្លងតាមការសេពកាម។ រោគដំបៅដែលគ្មានរូបរាងអោយងាយឃើញ ក៏អាចឆ្លងតាមការសេពកាមនេះដែរ ប៉ុន្តែគេមិនសូវដឹងច្រើនអំពីការនេះទេ។ អ្នកដែលមានតួសេពកាមជាប់លាប់ ហើយមិនបានប្រើស្រោមលិង ប្រហែលជាចង់ពិគ្រោះជាមួយគូស្នេហា រឹក៏ក្រុមពេទ្យ (ប្រសិនបើចាំបាច់)អំពីការផ្តើមប្រើស្រោមលិង។ ចំពោះអ្នកដែលមានដៃគូថ្មី រឹក៏ដៃគូម្តងម្កាល គេគួរតែប្រើស្រោមលិងជាតិច្នោះ។ ការនេះនឹងជួយការពាររោគផ្សេងទៀតដែលឆ្លងតាមការសេពកាមផងដែរ។

តើអាវាទណាខ្លះដែលគេគួរអោយទៅអ្នកដែលមានរោគនេះ រឹក៏អ្នកទទួលការព្យាបាលរោគនេះ?

- អ្នកដែលទទួលការព្យាបាលសាច់រឹសដែលគេមើលឃើញ គួរតែរក្សាកន្លែងកើតរឹសអោយស្អាតនិងស្ងួត ដោយភ្លិតភ្លាមប្រៃ និងជូតកន្លែងកើតរឹសអោយស្ងួតមែនទែន - មួយថ្ងៃម្តងគ្រប់គ្រាន់ហើយ។
- តួសេពកាមជាប់លាប់គួរតែទៅអោយពេទ្យពិធីត្យមើល ក្រែងមានរោគសាច់រឹសនេះ។ ប្រសិនបើ គេមិនច្បាស់ថា តើគេត្រូវពិគ្រោះជា មួយគូជាប់លាប់យ៉ាងណានោះ គេគួរទៅរកទីប្រឹក្សារឹក៏ពួកពេទ្យ។
- បន្ថយ រឹក៏បញ្ឈប់ការជក់បារី។
- ស្រ្តីគួរតែទៅអោយគេធ្វើការបំបែកវិភាគប៉ាប់ស្លៀរ អោយបានទៀងទាត់។ក្រុមពេទ្យគួរពិគ្រោះអំពីការធ្វើប៉ាប់ស្លៀរលើកក្រោយ។
- ចូរប្រើស្រោមលិងជាមួយតួសេពកាមថ្មី រឹក៏តួសេពកាមម្តងម្កាល។

