

**HIV/AIDS YOUR QUESTIONS
ANSWERED**

CAMBODIAN

HIV/AIDS
ចម្លើយទៅនឹង
សំណួររបស់អ្នក

តើ AIDS ជាអ្វីទៅ?

AIDS (អេដស៊ី) ជាអក្សរកាត់នៃពាក្យ Acquired Immune Deficiency Syndrome (អាការរោគនៃការទន់ខ្សោយប្រព័ន្ធបណ្តាញរោគដែលទទួលបាន)។

Acquired (ទទួលបាន) មានន័យថា មិនទទួលបានដំណាល។

Immune Deficiency (ការទន់ខ្សោយប្រព័ន្ធបណ្តាញរោគ) មានន័យថា ការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធការពារបណ្តាញរោគរបស់រាងកាយ។

Syndrome (អាការរោគ) សំដៅអំពីការប្រមូលផ្តុំជំងឺទាំងឡាយ ដែលប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជំងឺមួយទៀត។ នៅក្នុងករណីនេះ ជំងឺទាំងឡាយដែលធ្លាក់ទាញយកប្រយោជន៍នៃការដួលរលំរបស់ប្រព័ន្ធបណ្តាញរោគរាងកាយ ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់អត្ថន័យដល់ផ្នែកក្តើមនៃ AIDS។

តើអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យមាន AIDS?

វីរុសជាកត្តាធ្វើឱ្យមាន AIDS ។ វីរុសនេះហៅថា វីរុសធ្វើឱ្យទន់ខ្សោយដល់ការបណ្តាញរោគនៃមនុស្ស (Human Immunodeficiency Virus) ឬ HIV ។

HIV វាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ ធ្វើឱ្យកើតជំងឺឆ្លងនិងមហារីកផ្សេងៗ។

ចំនួនប្រហែល 50 ភាគរយនៃអ្នកមាន HIV នឹងកើតមានជំងឺឆ្លង និង/ឬ មហារីកធ្ងន់ធ្ងរទាំងឡាយ (AIDS) នៅក្នុងកម្ពុជា ក្នុងពេល 10 ឆ្នាំនៃពេលឆ្លងវីរុសនេះ។ អ្នកខ្លះដែលមាន AIDS តាមទំរង់មិនសូវជាខ្លាំងក្លាទាំងនេះ ប្រហែលជាមានជំងឺកាត់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅពេលក្រោយមកទៀត។ អ្នកមាន HIV មួយចំនួនតូច មិនមានបង្ហាញនូវការចុះដុះនៃសុខភាពរបស់គេឡើយ សូម្បីតែនៅក្រោយពេល 10 ឆ្នាំក៏ដោយ។

តើវិជ្ជមាននឹងអង្គបដិបក្ខ HIV (HIV antibody positive) មានន័យអ្វីទៅ?

អ្នកដែលឆ្លង HIV កើតមានអង្គបដិបក្ខ(ប្រូតេអ៊ីនដែល
រាងកាយបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងមេរោគ)។ អង្គ
បដិបក្ខទៅនឹង HIV ជាធម្មតាអាចតាមរកឃើញបាននៅ
ក្នុងកម្រិតពេលពីរអាទិត្យទៅបីខែ បន្ទាប់ពីឆ្លងវិរុសនេះ
មក។ គេអាចតាមរកឃើញអង្គបដិបក្ខទាំងនេះបាន
ដោយការធ្វើតេស្តឈាម ដែលគួរមានការធ្វើតេស្តជាបន្ត
ថែមទៀតនៅពេល 12 អាទិត្យ ក្រោយពីនោះ។

នៅពេលដែលអង្គបដិបក្ខត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឈាម
នៃអ្នកដែលឆ្លង HIV គេនិយាយថា អ្នកទាំងនោះវិជ្ជមាន
នឹងអង្គបដិបក្ខ HIV ។

ជនណាដែលវិជ្ជមាននឹងអង្គបដិបក្ខ HIV ប្រហែលជាមិន
មាន AIDS ទេ ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះព័ន្ធវិរុសនេះនឹងអាច
ចម្លងវាតាមរយៈឈាមឬការរួមសង្វាសដែលមិនមានការ
ការពារ។

តើមានការធ្វើតេស្តអ្វីទៅសម្រាប់ រក មើល AIDS?

ការឆ្លងកើត HIV មិនមែនមានន័យថា អ្នកនោះមាន AIDS
ឡើយ។ រោគវិនិច្ឆ័យនៃ AIDS ត្រូវបានកើតឡើងនៅ
ពេលមានការខូចខាតប្រព័ន្ធបន្សុំរោគតែប៉ុណ្ណោះ ដែល
បណ្តាលឲ្យកើតជំងឺឆ្លងនិងមហារីក។ រោគវិនិច្ឆ័យប្រ
ហែលជាត្រូវការឲ្យមានការធ្វើតេស្តតាមមន្ទីរពិសោធន៍
ពិសេសមួយចំនួន។

ការធ្វើតេស្តលើអង្គបដិបក្ខ HIV បង្ហាញថា តើជនណាមួយ
មានឆ្លងវិរុសនេះដែរឬទេ។ ការធ្វើតេស្តនេះមិនប្រាប់គេ
ថា គេមាន AIDS ឬនឹងបន្តទៅជាកើតមាន AIDS នោះទេ។

នៅពេលអ្នកមានការធ្វើតេស្ត វាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុង
ការទទួលបាននិវាទនៅមុននិងក្រោយការធ្វើតេស្តនេះ។

តើគេអាចព្យាបាលឬធ្វើឲ្យ AIDS ជា សះស្បើយដែរឬទេ?

គ្រួសារថ្ងៃនេះ ពុំមានថ្នាំចាក់ការពារឬព្យាបាល AIDS ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏មានការព្យាបាលថ្មីប្រើថ្នាំក្នុង ផ្សំគ្នា ដែលអាចគ្រប់សិន HIV ហើយដែលត្រូវបានយល់ ថាអាចពន្យារការរីកចម្រើនទៅជា AIDS ។

ការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺជាក់លាក់ជាច្រើនដែលទាក់ទង នឹង AIDS ក៏មានផងដែរ។

ថ្នាំនិងការព្យាបាលថ្មីទាំងឡាយ កំពុងទទួលការសាក ល្បងនៅគ្រប់ពេលទាំងអស់។

តើអ្នកឆ្លង HIV តាមរបៀបណា?

HIV អាចចម្លងតាម:

- ការរួមសង្វាសមិនមានការការពារ (តាមភូមិប្រយោជី) ជាមួយនឹងអ្នកកើតរោគ។
- ឈាមនៃអ្នកមានរោគចូលទៅក្នុងដំណើរឈាមរត់នៃ ជនមួយទៀត (ដូចជាដោយពេលដែលអ្នកប្រើថ្នាំញៀន ដោយការចាក់មូល ប្រើមូល សីរ៉ាំងនិងស័ក្តារចាក់ ដទៃទៀតរួមគ្នា)។
- ម្តងម្កាលគឺឆ្លងពីម្តាយដែលកើតរោគទៅកាន់ទារក ក្នុងកម្មវិធីពេលមានផ្ទៃពោះ ពេលសម្រាលកូន ឬ តាមរយៈទឹកដោះម្តាយ។

នៅប្រទេសសូហ្គាណី HIV ឆ្លងជាទូទៅបំផុតដោយសារ ការរួមសង្វាសដោយពុំមានប្រើស្រោមការពារ (condom) និងតាមរយៈការប្រើរួមគ្នានូវមូល សីរ៉ាំង និងស័ក្តារចាក់ ដទៃទៀត ដោយអ្នកប្រើថ្នាំញៀនចាក់តាមមូល។

គេពុំមានភស្តុតាងឡើយដែលថា HIV ឆ្លងតាមរយៈការ ទាក់ទងក្នុងសង្គមឬក្នុងគ្រួសារជាធម្មតា។

តើខ្ញុំអាចឆ្លង HIV ពីទឹកមាត់,
សត្វ, បង្កំ, សត្វល្អិត,
ការចាប់ដៃរលាក់, ថាធូថ្នាំ,
អាងហែលទឹក ។ល។និង ។ល។
ដែរឬទេ?

គេមិនមានភស្តុតាងនៅទីកន្លែងណាមួយក្នុងពិភព
លោកដើម្បីផ្តល់មតិថា HIV ឆ្លងរាលដាលតាមរយៈវិធី
ណាមួយក្នុងចំណោមវិធីទាំងនេះឡើយ។ HIV មិនអាច
ឆ្លងតាមរយៈការទាក់ទងក្នុងសង្គម ដូចជាការទិប ការចាប់
ដៃរលាក់ ការប្រើសំភារៈក្នុងផ្ទះរួមគ្នា ជើងអង្កុយនៃ
បង្កំ អាងហែលទឹក ឬសត្វល្អិតណាមួយ។

ថ្នាំធ្វើឲ្យសយ៉ាងសាមញ្ញប្រើតាមផ្ទះ ឬក៏សាប៊ូនិងទឹកក្តៅ
ឧណ្ណៗអាចសម្រាប់ HIV ។

តើអ្វីជាការរួមសង្វាសមានសុវត្ថិ
ភាពឬកាន់តែមានសុវត្ថិភាព?

ការរួមសង្វាសមានសុវត្ថិភាពឬកាន់តែមានសុវត្ថិភាពមាន
ន័យថា សកម្មភាពរួមសង្វាសដែលទឹកកាម សារធាតុបុ
ណ្ណាមបញ្ចេញដោយយោធី ពុំមានប្តូរគ្នារវាងដៃគូរួម
សង្វាស។ សកម្មភាពរួមសង្វាសដែលមានលទ្ធភាពមាន
គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង រួមមានការរួមសង្វាសតាមតួទុបយោធី
ដែលមិនមានការការពារ ជាមួយនឹងដៃគូដែលមាន HIV ។

សកម្មភាពរួមសង្វាសមានសុវត្ថិភាពរួមមាន ការកាន់ស្លាប
អង្កែលអង្កុយជាតិ (masturbation) ទៅវិញទៅមក ការប៉ះ
ស្លាបគ្នា ការទិបថ្នាក់ថ្នម ការប៉ះកកិតរវាងពងកាយ និង
ការធ្វើសរសៃធ្វើឲ្យស្រើបស្រាល។

ការប្រើស្រោមការពារឲ្យបានសមស្របក្នុងកម្រិតការរួម
សង្វាស (តាមតួទុនិងយោធី) នឹងកាត់បន្ថយជាខ្លាំងដល់
លទ្ធភាពមានគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លង HIV ។ ស្រោមការពារ
ត្រូវតែប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជាមួយនឹងប្រេងរំអិលផ្អែក
លើជាតិទឹកយ៉ាងច្រើន។ ប្រេងរំអិលផ្អែកលើជាតិប្រេង
កាតឬប្រេង នឹងបណ្តាលឲ្យស្រោមការពាររែហោក។

តើការរួមសង្វាសដោយប្រើមាត់ ជាវិធីចម្លង HIV ឬ?

គេពុំមានភស្តុតាងដើម្បីផ្តល់មតិថា ការរួមសង្វាសដោយប្រើមាត់ គឺជាឥរិយាបថបង្កលទ្ធភាពមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់ចម្លង HIV ទេ ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែប្រើស្រោមការពារ។

នៅពេលដែលដៃគូណាមួយមានពងទឹកថ្លាតូចៗនៅលើស្បែក (herpes) ដំបៅឬអញ្ចាញធ្មេញចេញឈាម វាជាការប្រសើរដើម្បីចៀសវាងការរួមសង្វាសដោយប្រើមាត់ ឬចេញទឹកកាមទៅក្នុងមាត់។

តើការចើបជញ្ជក់មាត់យ៉ាងជ្រៅ គឺជា វិធីចម្លង HIV ឬ?

ទឹកមាត់នៃអ្នកមានរោគ មានវិរុស HIV មួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីកើតមានការឆ្លងរោគ គេនឹងត្រូវការទឹកមាត់តាមបរិមាណយ៉ាងច្រើនជាខ្លាំងឲ្យចូលទៅក្នុងដំណើរឈាមរត់។ ហេតុដូច្នោះការចើបជញ្ជក់មាត់យ៉ាងជ្រៅ ពុំមែនជាឥរិយាបថបង្កលទ្ធភាពមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ចម្លង HIV ទេ។

តើអ្វីជាលទ្ធភាពនៃអាការរោគរបស់ AIDS?

អាការរោគជាធម្មតាខ្លះនៃជំងឺទាក់ទងនឹង HIV គឺ:

- ការហត់ឆ្អោយយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងជាប់ជាទីធ្លា។
- ត្រូវក្តៅ ត្រូវរងា និងការបែកញើសនៅពេលយប់ជាញឹកញយ។
- ការចុះទម្ងន់យ៉ាងលឿនដោយពុំមានមូលហេតុច្បាស់។
- ការហើមក្រពេញលសិកានៅនឹងក ភ្លើក ឬកន្លែងក្រលៀន។
- ស្នាមពណ៌ស ឬស្នាមមិនធម្មតានៅក្នុងមាត់។
- ស្នាមឬស្នាមពកលើស្បែក (ហើមឬក៏ស្របែត ជាធម្មតាមិនឈឺទេ ហើយខ្លាំងពណ៌ស្វាយបន្តិច)។
- ក្អកមិនបាត់ឬក្អកស្អុត។
- រាគុស។
- ការថយចុះនៃការឃ្លានចំណីអាហារ។

អាការរោគទាំងនេះមានជាទូទៅចំពោះជំងឺមួយចំនួន រួមមានជំងឺដែលទាក់ទងនឹង HIV ។ បើអ្នកមានសញ្ញាណាមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាទាំងនេះ (ឬការរួមគ្នាណាមួយនៃសញ្ញាទាំងនេះ) អស់ពេលមួយខែឬក៏យូរជាងនេះដោយពុំមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ អ្នកគួរទៅជួបពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នក។

តើអ្វីជាលទ្ធភាពមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្លង HIV

តាមរយៈការចាក់បញ្ចូលឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ?

ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ 1985 មក ការធ្វើអំណោយឈាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ត្រូវបានឆែកពិនិត្យរកមើលអង្គបដិបក្ខ HIV ។ បើអ្នកមានការចាក់បញ្ចូលឈាម រវាងឆ្នាំ 1980 ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ 1985 អ្នកប្រហែលជាមានបំណងទៅជួបនិយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នក អំពីការធ្វើតេស្តរកមើលអង្គបដិបក្ខ HIV ។

តើខ្ញុំអាចឆ្លង HIV ឬទេ នៅពេលធ្វើ អំណោយឈាម?

មិនអាចឆ្លងទេ។ ម្ហូប កញ្ចប់ ប្រដាប់ជួត កាំបិតចាក់ម្រាម ដៃ និងវត្ថុទាំងឡាយឥតចឹងនោះ មិនដែលច្រើនជាថ្មីទេ។

តើរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើអ្វីទៅអំពី HIV/AIDS?

រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋ កំពុងធ្វើសហការជាមួយ អង្គការផ្នែកលើសហគមន៍ ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹង HIV/AIDS ។ ហេតុការណ៍នេះកំពុងកើតឡើងតាមរយៈការព្យាបាល ការផែនការពិនិត្យឈាម ការអប់រំយ៉ាងខ្លាំងក្លា ការស្រាវជ្រាវ ការហ្វឹកហ្វឺននិងផ្តល់ឱវាទ។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានព័ត៌មាននិងជំនួយពី ទីណា?

AIDSLINE

ទូរស័ព្ទ: (03) 9347 6099, 1800 133 392,
1800 032 665 (TTY)

ម៉ោង: ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ 9.00 ព្រឹកដល់ 10.00 យប់
ថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យ 11.00 ព្រឹកដល់ 2.00 រសៀល,
7.00 យប់ដល់ 10.00 យប់។

សេវា(កិច្ចបំរើ)ផ្តល់និវាទ ព័ត៌មាន និងការបញ្ជូនតាម
ទូរស័ព្ទ។

Melbourne Sexual Health Centre

580 Swanston Street, Carlton 3053

ទូរស័ព្ទ: (03) 9347 0244 (រួមទាំង TTY), 1800 032 017

ការធ្វើតេស្ត ព័ត៌មាន ការអប់រំ ការផ្តល់និវាទ ការព្យាបាល
ដោយមិនមានគិតថ្លៃ។

សូមធ្វើការណាត់ជួប។

Victorian AIDS Council/Gay Men's Health Centre

6 Claremont Street, South Yarra 3141

ទូរស័ព្ទ: (03) 9865 6700, 9827 3733 (TTY),

1800 134 840

ព័ត៌មាន ផលប៉ះពាល់ ការបញ្ជូន ការអប់រំ ការគាំទ្រ ការផ្តល់
និវាទ ការធ្វើតេស្ត ការព្យាបាល។

Positive Living Centre/People Living with

HIV/AIDS

46 Ackland Street, St Kilda 3182

ទូរស័ព្ទ: (03) 9525 5866

ការគាំទ្រចំពោះអ្នកកើតឬអ្នកប៉ះពាល់ដោយ HIV/AIDS ។

The Centre Clinic

c/- Northcote Community Health Centre

42 Separation Street, Northcote 3070

ទូរស័ព្ទ: (03) 9481 7155

សេវាព្យាបាល។

STD/Blood-Borne Virus Program

Department of Human Services

GPO Box 4057, Melbourne 3001

ទូរស័ព្ទ: (03) 9616 7777

ព័ត៌មាន ការបញ្ជូន ផលប៉ះពាល់។

Infectious Diseases & Microbiology Service

Alfred Hospital

Commercial Road, Prahran 3181

ទូរស័ព្ទ: (03) 9276 2000

សេវា HIV/AIDS ការព្យាបាលអ្នកជម្ងឺក្នុង/ក្រៅមន្ទីរពេទ្យ
ការធ្វើតេស្ត។

Infectious Diseases Service

Royal Melbourne Hospital

Grattan Street, Parkville 3052

ទូរស័ព្ទ: (03) 9342 7000

អ្នកជម្ងឺក្នុង/ក្រៅមន្ទីរពេទ្យ ការព្យាបាល ការធ្វើតេស្ត។

Communicable Diseases Service

Royal Women's Hospital

132 Grattan Street, Carlton 3053

ទូរស័ព្ទ: (03) 9344 2000

អ្នកជម្ងឺក្នុង/ក្រៅមន្ទីរពេទ្យ ការព្យាបាល ការធ្វើតេស្ត
ការស្រាវជ្រាវ។

STD Clinic

Western General Hospital

Gordon Street, Footscray 3011

ទូរស័ព្ទ: (03) 9319 6666

អ្នកជម្ងឺក្នុង/ក្រៅមន្ទីរពេទ្យ ការព្យាបាល ការធ្វើតេស្ត។

Sexual Health Clinic

Mornington Peninsula Hospital

Hastings Road, Frankston 3199

ទូរស័ព្ទ: (03) 9784 7777

អ្នកជម្ងឺក្នុង/ក្រៅមន្ទីរពេទ្យ ការព្យាបាល ការធ្វើតេស្ត។

Haemophilia Foundation Australia
860 Nepean Highway, Moorabbin 3189
ទូរស័ព្ទ: (03) 9555 7595
ព័ត៌មាន ការគាំទ្រចំពោះអ្នកមានឈាមមិនងាយកក។

Victorian Intravenous Drug Users AIDS Group (VIVAIDS)
765A Nicholson Street, North Carlton 3054
ទូរស័ព្ទ: (03) 9381 2286
ព័ត៌មាន ការអប់រំ ផលប៉ះពាល់។

Family Planning Victoria
901 Whitehorse Road, Box Hill 3128
ទូរស័ព្ទ: (03) 9257 0100
ព័ត៌មាន ការអប់រំ ការផ្តល់ឱវាទ ការធ្វើតេស្ត ការព្យាបាល។

Action Centre (for Youth)
277 Flinders Lane, Melbourne 3000
ទូរស័ព្ទ: (03) 9654 4766, 1800 013 952
ព័ត៌មាន ការអប់រំ ការផ្តល់ឱវាទ ការធ្វើតេស្ត ការព្យាបាល។

Rural STD clinical services
Sexual Health Family Planning Clinic
The Annexe
Ballarat CHC
105 Humffray Street South, Ballarat 3350
ទូរស័ព្ទ: (03) 5333 1635

STD Clinic
Bendigo CHS
Seymoure Street, Eaglehawk 3556
ទូរស័ព្ទ: (03) 5434 4300

STD Clinic
Geelong CHS
40 Little Malop Street, Geelong 3220
ទូរស័ព្ទ: (03) 5221 4735

STD Clinic
Vermont Street Health Clinic
4 Benson Court, Wodonga 3690
ទូរស័ព្ទ: (02) 6056 1589

STD Clinic
Outpatient Department
Latrobe Regional Hospital
Princes Highway, Traralgon 3844
ទូរស័ព្ទ: (03) 5174 9800

បោះផ្សាយដោយ STD/Blood-Borne Virus Program, Public Health Branch, Victorian Government Department of Human Services.

លិខិតខ្លីនេះគឺផ្អែកទៅលើព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត ដែលមាននៅខែមករា ឆ្នាំ 1998 ។

ធីតន្ត្រីដោយ Wordsense.

គូសរៀបរៀងដោយ Outsource Design. (WS006F) 96/0514G

អាសយដ្ឋានក្នុង Internet: <http://hna.ffh.vic.gov.au/phb>