

រោគ Hepatitis C - ហេតុការណ៍

តើរោគ hepatitis ជាអ្វីទៅ?

Hepatitis គឺជាពាក្យទូទៅដែលប្រើដើម្បីពណ៌នាអំពីការរលាកថ្លើម។ សុរា ជាតិគីមី និងថ្នាំអាចបណ្តាលឲ្យមានការរលាកថ្លើម។ រោគនេះអាចបណ្តាលដោយការឆ្លងវីរុសផងដែរ។ រោគ hepatitis មានច្រើនប្រភេទ រួមមានប្រភេទ A, B, C, D, E, F និង G ។ វីរុសទាំងនេះប្រហែលជាបង្កើតអាការរោគស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែ ឆ្លងខុសគ្នា។ ដូច្នេះការការពារនិងការគ្រប់គ្រងគឺមានសភាពផ្សេងគ្នា។ ចំពោះវេជ្ជសាស្ត្រវិញ រោគទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺខុសគ្នា។ ខិត្តប័ណ្ណនេះ គឺអំពីរោគ hepatitis C តែប៉ុណ្ណោះ។

តើអ្វី ជាអាការរោគរបស់វា?

នៅក្នុងករណីជាច្រើន អ្នកដែលមានវីរុស hepatitis C ប្រហែលជាមិនឈឺឡើយ ចំណែកអ្នកដទៃទៀតប្រហែលជាជួបប្រទះនឹងជំងឺ "ដួចត្រងផ្កាសាយ" គឺថ្លើម ដែលមិនត្រូវការការព្យាបាល។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលដែលកើតមាន hepatitis C ជាដំបូងឡើង ទឹកនោមអ្នកខ្លះប្រហែលជាមានពណ៌ក្រមៅ ហើយផ្នែកពណ៌សនៃភ្នែកហើយនិងស្បែករបស់គេ ប្រហែលជាឡើងពណ៌លឿង(ខាងលឿង)។ អាការរោគ hepatitis ប្រហែលជាបាត់ទៅវិញនៅក្នុងពេលពីរបីអាទិត្យ ប៉ុន្តែនេះមិនចាំបាច់មានន័យថា រោគនោះបានបាត់រូបរាងផងដែរនោះទេ។ បើសិនជាអ្នកមានអាការរោគ hepatitis អ្នកគប្បីទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នក។

ការរលាកថ្លើមអាចកំណត់ដោយការធ្វើតេស្តឈាម ដើម្បីវាស់មើលអង់ហ្ស៊ីមពីរបស់ថ្លើម (ALT និង AST) ។ កំពស់នៃអង់ហ្ស៊ីមទាំងនេះ ចង្អុលបង្ហាញអំពីការខូចខាតថ្លើមជាបន្តទៅទៀត។

នៅពេលដែលការរលាកថ្លើមនៅមាននៅក្នុងរយៈពេលយូរជាងប្រាំមួយខែ ជំងឺនេះត្រូវបានហៅថា hepatitis C រ៉ាំរ៉ៃ។

- អាការរោគ hepatitis C រ៉ាំរ៉ៃ ប្រហែលជារួមមាន:
- ការអស់កម្លាំងបន្តិចបន្តួចរហូតដល់ខ្លាំងមែនទែន។
 - ពុំឃ្នាលចំណីអាហារ។
 - ដំណើរចង់ក្អក និងក្អត។
 - ឈឺពោះផ្នែកខាងលើ (នៅក្រោមឆ្អឹងជើង)។
 - គ្រុន។
 - ឈឺសន្តាក់។

តើរោគ hepatitis C មានគ្រោះថ្នាក់ឬ?

ជាង 70 ភាគរយនៃអ្នកដែលកើតរោគនេះ ប្រហែលជាបន្តមានវីរុសនេះនៅក្នុងឈាមរបស់គេ ហើយក្លាយជាអ្នកពាំនាំរោគនេះក្នុងរយៈពេលយូរឬរ៉ាំរ៉ៃ។ គេមានជំនឿថា អ្នកពាំនាំរោគរ៉ាំរ៉ៃនេះយ៉ាងតិច 20 ភាគរយ នឹងកើតទៅជារោគ cirrhosis ដែលបង្កឲ្យមានស្នាមនៅនឹងថ្លើម។ ដំណើរការនេះប្រហែលជាត្រូវការពេល 20 ឆ្នាំ ដើម្បីកើតឡើង។ នៅពេលប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមក អ្នកជំងឺមួយភាគជាក់លាក់ដែលមានរោគ cirrhosis ប្រហែលជាកើតទៅជារោគមហារីកថ្លើម។ គេមានជំនឿថា អ្នកពាំនាំរោគhepatitis C ប្រហែលជានៅតែមាន

រោគនេះពេញមួយជីវិតរបស់គេ ហេតុដូច្នេះប្រហែលជាមានសមត្ថភាពដើម្បីចម្លងរោគនេះទៅកាន់ជនដទៃនៅគ្រប់ពេលវេលា។

តើរោគ hepatitis C ឆ្លងតាមរបៀបណាទៅ?

Hepatitis C គឺជារោគឆ្លងតាមឈាម ដែលមានន័យថា ការឆ្លងរោគកើតឡើងតាមការទាក់ទងចេញពីឈាមទៅកាន់ឈាម។ វីរុស hepatitis C មានវត្តមាននៅក្នុងឈាមនៃអ្នកដែលមានរោគ hepatitis C ។ ការចម្លងវីរុសនេះ ជាញឹកញយបំផុតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលឈាមមានរោគ ចូលទៅក្នុងដំណើរឈាមរត់នៃជនម្នាក់ទៀត តាមរយៈស្បែកដាច់របែក ឬក៏ភ្លាសសំណើម (ដូចជាស្បែកសើមនៅក្នុងច្រមុះ មាត់ បំពង់កដើម)។

ភាគច្រើននៃប្រជាជនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមាន hepatitis C ឆ្លងរោគនេះដោយសារការប្រើសំភារៈចាក់ថ្នាំរួមគ្នា ដូចជាមូលនិងស៊ីរ៉ាំង ស្ថាបត្រា ប្រដាប់ដុសលាង និងទឹក។ ការប្រើឧបករណ៍ទាំងឡាយ ដូចជាមូលសម្រាប់សាក់ដែលមិនមានរម្ងាប់មេរោគមុនចាក់ទៅក្នុងស្បែក អាចចម្លងវីរុសនេះផងដែរ។ ការប្រើកាំបិតកោរ ឬប្រាសដុសធ្មេញរួមគ្នា ដែលជារបស់អ្នកមានរោគ hepatitis C ប្រហែលជាធ្វើឲ្យមានការឆ្លងរោគនេះផងដែរ។

វីរុសនេះក៏អាចឆ្លងទៅតាមវិធីដូចតទៅនេះ :

- **បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព**
ការឲ្យឈាមមានរោគប៉ះពាល់ទៅលើកន្លែងស្បែកមុតដាច់និងកោសដាច់ឬក៏មានរបួសដោយសារឧបករណ៍មានមេរោគនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព អាចបណ្តាលឲ្យឆ្លងរោគ។
- **ពីម្តាយទៅកាន់ទារក**
រោគ hepatitis C ប្រហែលជាឆ្លងពីម្តាយទៅទារក ប៉ុន្តែការឆ្លងនេះទំនងជាមានតិចជាងការឆ្លងរោគ hepatitis B ជាទូទៅជាខ្លាំង។ លទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងវីរុសតាមទឹកដោះ ត្រូវបានគិតថាមានតិចតួចណាស់។
- **ការរួមភេទ**
លទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការចម្លងរោគ hepatitis C ក្នុងកម្មវិធីការរួមភេទរវាងមនុស្សភេទដូចគ្នានិងភេទដូចគ្នា គឺមានតិចតួចណាស់ ជាពិសេសបើសិនជាដៃគូម្នាក់មានរោគ hepatitis C ខ្លាំងក្លានោះ។
- **អ្នកធ្វើអំណោយឈាម**
អ្នកធ្វើអំណោយឈាម ពុំមានលទ្ធភាពមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងរោគនេះឡើយ ហើយគ្រាសព្វថ្ងៃនេះលទ្ធភាពមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកទទួលការចាក់បញ្ចូលឈាមវិញ គឺមានតិចតួចណាស់ ដោយសារថា ចាប់ពីឆ្នាំ 1990 មក ការធ្វើអំណោយឈាមទាំងអស់ ត្រូវបានឆែកឆេរមើលរោគ hepatitis C ។

តើនរណាទៅដែលមានលទ្ធភាពមានគ្រោះថ្នាក់?

- អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមដូចតទៅនេះ មានកំណើននៃលទ្ធភាពមានគ្រោះថ្នាក់ ក្នុងការឆ្លងរោគ hepatitis C ។
- អ្នកប្រើថ្នាំដោយការចាក់មូល ដែលប្រើមូលនិងស៊ីរ៉ាំងរួមគ្នា។

- អ្នកឆ្លងកាត់ទំនងការចាក់ចូលតាមស្បែក ដូចជាសាក់ និងចោះ រាងកាយ ដោយសំភារៈមិនមានរម្ងាប់មេរោគ។
- អ្នកទទួលការចាក់បញ្ចូលឈាមមុនខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1990 ។
- បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់គេបានធ្វើឲ្យគេ ប៉ះពាល់ឈាម។
- អ្នកជម្ងឺតំរង់ទឹកម្សៅដែលត្រូវការការបញ្ចេញជាតិសំណល់ចេញ ពីឈាម និងអ្នកដែលមានបញ្ហាដោយសារឈាមមិនកក។

ចំនួនប្រមាណជា 25 ភាគរយនៃអ្នកដែលមានមេរោគ hepatitis C មិនទំនងជាបិតនៅក្នុងក្រុមខាងលើនេះឡើយ។

តើខ្ញុំ ចៀសវាងមិនឆ្លង មេរោគនេះតាមរបៀបណា?

- ចំពោះអ្នកដែលចាក់ថ្នាំ :
 - លាងសំអាតដៃអ្នកជាជំរាប មុនពេលនិងក្រោយពេលចាក់។
 - កុំប្រើរួមគ្នាផ្លូវមូល សីរ៉ាំង និងសំភារៈដទៃទៀតទាល់តែសោះ ដូចជាស្លាបព្រា ប្រដាប់ដុសលាង ទឹកដោះដើម។ល។ ប្រើម្ជុល និងសីរ៉ាំងស្អាតល្អជាជំរាប។ សំភារៈទាំងនេះមាននៅឯឱសថ ស្ថានខ្លះនិងកន្លែងប្តូរមូលនិងសីរ៉ាំង។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន បន្ថែមអំពីទីកន្លែងទទួលមូលនិងសីរ៉ាំងស្អាតល្អ ឬបើចាំបាច់ អំពីរបៀបសំអាតសំភារៈទាំងនេះ សូមទាក់ទង

DIRECTLINE តាមលេខ (03) 9416 1818 ឬ 1800 136 385 ។

- ចូរកុំប្រើសំភារៈផ្ទាល់ខ្លួនរួមគ្នា ដូចជាប្រាសដុសធ្មេញ កាំបិតកោរ ប្រដាប់ដុសខាត់ប្រកប ដោយសារថា សំភារៈទាំងនេះអាច ទម្លុះស្បែក ហើយប្រឡាក់ដោយឈាម។
- ចំពោះអ្នកធ្វើប្តូរអ្នកទទួលការបោះវត្ថុច្រៀក ការសាក់ អគ្គិសនី វិភាគឬមូលវិទ្យាសាស្ត្រវិញ ត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដជាជំរាបថា សំភារៈ ណាមួយដែលចាក់ទម្លុះស្បែក ត្រូវតែរម្ងាប់មេរោគ បន្ទាប់ពីប្រើ ហើយ។
- បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពគប្បីគោរពទៅតាមសេចក្តីណែនាំជាទូទៅ លើការទប់ទល់ការឆ្លងមេរោគ។
- ប្រតិបត្តិ "ការរួមរក្សាមានសុវត្ថិភាព" ។ ចំពោះអ្នកសកម្មខាងការ រួមរក្សាវិញ ការប្រើស្រោមការពារដោយត្រឹមត្រូវនិងមិនផ្លាស់ប្តូរ សំរាប់ការរួមភេទតាមយោនីនិងដោយមាត់ជាមួយបុរសនិងស្ត្រី នឹងកាត់បន្ថយលទ្ធភាពមានគ្រោះថ្នាក់លើការឆ្លងមេរោគ។ អ្នកដែល មានទំនាក់ទំនងមានស្ថិរភាពរយៈពេលយូរ ត្រូវការគិតគូរនិង ពិភាក្សាលើការប្រើស្រោមការពារជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់គេ។ នៅគ្រាសព្វថ្ងៃនេះ គេមិនមានថ្នាំចាក់ដើម្បីការពារមិនឲ្យឆ្លងមេរោគ hepatitis C ឡើយ។

តើខ្ញុំ គួរធ្វើអ្វីបើខ្ញុំមានមេរោគ hepatitis C រួចទៅ ហើយនោះ?

- ចៀសវាងកុំសេពសុរា (កុំឲ្យលើសពីខ្នាតកម្រិត "standard drink" បួនប្រាំដងសំរាប់បុរស និងបីបួនដងសំរាប់ស្ត្រី ក្នុងមួយអាទិត្យ) ពីព្រោះសុរាបង្កើនល្បឿនការកើតទៅជា cirrhosis ។
- ពិគ្រោះយោបល់វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នក ដែលនឹងតាមពិនិត្យស្ថានភាពអ្នក ហើយបើចាំបាច់ នឹងបញ្ជូនអ្នកទៅជួបអ្នកឯកទេស។
- រក្សាការបរិភោគចំណីអាហារមានគ្រឿងធ្វើឲ្យផ្លាស់ ដែលមាន លំនឹងយ៉ាងល្អ និងមានជាតិខ្លាញ់តិច។
- សំរាកនៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន។

តើខ្ញុំ គួរធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ឈប់ ការរីកសាយភាយនៃ hepatitis C?

បើអ្នកមានវិរុស hepatitis C អ្នកគួរប្រកាន់ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន ដូចតទៅនេះ ដើម្បីការពារកុំឲ្យរាលដាល :

- ពិភាក្សាស្ថានភាពអ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាពអ្នក នៅ ពេលឆ្លងកាត់ទំនងការណាមួយដើម្បីព្យាបាលឬធ្វើធ្មេញ។
- ជួតការកំចាត់ហូរឈាមណាមួយចេញឲ្យបានហ្មត់ចត់ ដោយប្រើ ស្រោមដៃជាមួយថ្នាំធ្វើឲ្យស្រាលដែលប្រើក្នុងផ្ទះ និងកន្លែងក្រដាស ដែលអាចបោះចោលបាន។
- ប្រើក្រណាត់រុំដំបៅប្របន្ថុះ bandaid ដើម្បីរុំបិទគ្របកន្លែងមុតឬ រមួសឲ្យបានពេញលេញ។
- ដាក់ក្រដាសទន់ដែលប្រឡាក់ឈាម កន្លែងអនាម័យ ឬក្រណាត់ រុំដំបៅទៀតដែលប្រឡាក់ឈាម ទៅក្នុងស្បោងផ្លាស្ទិក មុនពេល បោះចោល។
- ប្រតិបត្តិការរួមរក្សាមានសុវត្ថិភាព ក្នុងកម្មវិធីណាមួយកាលខ្លាំង។

- អ្នកមិនគប្បី :
- ធ្វើអំណោយឈាម ឬសរីរាង្គដទៃទៀតនៃរាងកាយ។
 - ប្រើសំភារៈចាក់រួមគ្នា។
 - ប្រើសំភារៈផ្ទាល់ខ្លួនរួមគ្នា ដូចជាប្រាសដុសធ្មេញ ឬកាំបិតកោរ។

តើមានវិធីព្យាបាលមេរោគ hepatitis C រឺវិវិចទេ?

ការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រឆាំងវិរុសត្រូវបានប្រើដើម្បីបន្ថយការ រលាកថ្លើម។ វាមានឥទ្ធិពលបន្តាប់បន្សំផ្សេងៗខ្លះ ហើយលទ្ធផលនៃ ការសិក្សារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងបរទេសផ្តល់មតិថា មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំ ណោមប្រាំនាក់ ប្រហែលជាទទួលបានប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលយូរ។ អ្នក គួរពិភាក្សានិងវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នក អំពីជំងឺនៃការព្យាបាលទាំងឡាយ។

តើមានការធ្វើតេស្តសំរាប់មេរោគ hepatitis C ឬ?

ការធ្វើតេស្តឈាមសំរាប់ hepatitis C មាននៅឆ្នាំ 1990 ។ វាប្រ ហែលជាត្រូវការពេលពីរឬបីខែចាប់ពីពេលឆ្លងមេរោគនេះ មុនពេលការ ធ្វើតេស្តឈាមអាចតាមរកមើលភស្តុតាងនៃការឆ្លងមេរោគ (គឺថា មាន វត្តមាននៃអង្គបដិបក្សនៅក្នុងឈាម)។ តេស្តនេះអាចបង្ហាញថា អ្នក កើតមានមេរោគនេះនៅពេលណាមួយកាលពីពេលកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនអាចកំណត់ថាតើអ្នកកើតមានមេរោគនេះក្លាយទៅជា អ្នកពាំនាំ មេរោគឡើយ។

មន្ទីរពិសោធន៍ឯកទេសអាចធ្វើតេស្តដែលប្រហែលជាជួយរកមើល ថាតើវិរុសនេះនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងឈាមឬថ្លើមនៃជនម្នាក់បាន ប៉ុន្តែតេស្តប្រភេទនេះមិនធ្វើទៅជាប្រក្រតីឡើយ ហើយថ្លៃទៀតផង។

ព័ត៌មានបន្ថែម

- ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង :
 - Hepatitis C Helpline
 - ទូរស័ព្ទលេខ (03) 9349 1111
 - អ្នកនៅជនបទប្រើលេខ 1800 800 241
 - ឬ
 - Hepatitis C Support Line
 - Hepatitis C Council
 - Level 9
 - Carlow House
 - 289 Flinders Lane
 - Melbourne 3000
 - ទូរស័ព្ទលេខ (03) 9639 3200
 - អ្នកនៅជនបទប្រើលេខ 1800 703 003

បោះផ្សាយដោយ Infectious Disease Unit, Public Health Branch, Victorian Government Department of Human Services.
 ទិគ្គបណ្ណនេះផ្អែកទៅលើព័ត៌មានចុងក្រោយដែលមាននៅត្រឹមខែមេសា 1998 ។ រៀបចំនិងផលិតដោយ Human Services Promotion Unit