

ថ្នាំ សំរាប់

ព្យាបាល

រោគរមេង

ISONIAZID

RIFAMPIN

RIFAMATE

PYRAZINAMIDE

ETHAMBUTOL

SEATTLE-KING COUNTY
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
TUBERCULOSIS CONTROL
PROGRAM

1207 PUBLIC SAFETY BLDG.
SEATTLE, WA.
98104
(206) 296- 4747

3/95

អ្នកជម្ងឺ

ឈ្មោះ: _____

ថ្នាំ

ចាប់ផ្តើម

ថ្ងៃ _____

CAMBODIAN

ថ្នាំ **ISONIAZID** (អាយសូណាយស៊ីត)

ប្រតិកម្មរបស់ថ្នាំដែលត្រូវសង្កេតមើល(វេជ្ជសាស្ត្រក្នុងខណៈលេបថ្នាំINHនេះ

- ស្លឹក ហើយឈឺឈៀង។ នៅតាមចុងម្រាមដៃនិងចុងម្រាមជើង

ប្រាប់ទៅគ្រូពេទ្យឬក៏គិលានុដ្ឋយិកាជាបន្ទាន់ បើសិនជាអ្នកកំពុង

លេបថ្នាំ រៀបនិងចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំពីមុខខាងក្រោមនេះនៅ

ក្នុងពេលជាមួយដែលអ្នកលេបថ្នាំ INH

- ថ្នាំ **ANTABUSE**(អ័ង់តាបូស) (ថ្នាំបញ្ឈប់ជីកសុរា)

- ថ្នាំ **DILANTIN**(ដាយលង់ទិន)

(ថ្នាំសម្រាប់បញ្ឈប់ប្រកាច់នឹងភ្នែក)

ថ្នាំ **RIFAMPIN** (រ៉ាយហ្វាម៉ាតិន)

ប្រតិកម្មរបស់ថ្នាំ **RIFAMPIN** ដែលត្រូវសង្កេតមើលក្នុងខណៈ

ដែលកំពុងលេបថ្នាំនេះ

- សាច់ដាំងាយបំផុត

- ស្លឹក ឬឈឺឈៀង។ នៅតាមចុងម្រាមដៃនិងចុងម្រាមជើង

- បង្កើនការឈឺចាប់នៅពេលមានផ្ទៃ

ថ្នាំ **RIFAMPIN** អាចធ្វើឲ្យទឹកនោម, ញើស, ទឹកមាត់, ទឹកភ្នែក និងលាមកមានពណ៌ក្រហម ឬ ពណ៌ទឹកក្រូចនៅ ក្នុងពេលដែល អ្នកលេបថ្នាំនេះ។ វាជាការធម្មតាទេហើយមិនធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចសរីរាង្គរបស់ អ្នកទេ ។ ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកពាក់កែវភ្នែកវិញ វាអាចធ្វើឲ្យកែវ ភ្នែកមានដាមជាប់ពណ៌ទឹកក្រូច ជាប់កែវផង ។

ប្រាប់ទៅគ្រូពេទ្យឬក៏គិលានុដ្ឋយិកាជាបន្ទាន់បើសិនជាអ្នក កំពុងលេបថ្នាំរៀបនិងចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំមុខខាងក្រោមនេះនៅ ក្នុងពេលជាមួយដែលអ្នកលេបថ្នាំ **RIFAMPIN**

- ថ្នាំគ្រាប់ការពារមិនឲ្យមានកូន, ទាំងថ្នាំចាក់ និង ថ្នាំសិកតាមដៃ

- ថ្នាំបញ្ឈប់ប្រើគ្រឿងញាណ

- ថ្នាំ **THEOPHYLLINE** សម្រាប់ព្យាបាលសួត

- ថ្នាំសំរាប់បេះដូង, ឈាម, និងថ្នាំសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែម,

ថ្នាំវិលាបការឈឺចាប់ ឬក៏ថ្នាំវិលាបចិត្ត ។

ថ្នាំ **RIFAMATE** (រ៉ាយហ្វាម៉ាត)

ថ្នាំ **RIFAMATE** ជាថ្នាំដែលមានឈាមបញ្ចូល

ជាតិថ្នាំ **ISONIAZID** ចំនួន ១៥០mg ជាមួយជាតិថ្នាំ

RIFAMPIN ចំនួន 300mg ជាមួយក្នុងមួយគ្រាប់ ។

ប្រតិកម្មរបស់ថ្នាំ **RIFAMATE** ដែលត្រូវសង្កេតមើល

(វេជ្ជសាស្ត្រក្នុងខណៈលេបថ្នាំនេះ :

- ស្លឹកឬឈឺឈៀង។ នៅតាមចុងម្រាមដៃនិងម្រាមជើង

- បង្កើនការឈឺចាប់នៅពេលមានផ្ទៃ

- សាច់ដាំងាយ បំផុត

ថ្នាំ **RIFAMATE** អាចធ្វើឲ្យទឹកនោម, ញើស, ទឹកមាត់, ទឹកភ្នែក និងលាមកមានពណ៌ក្រហម ឬពណ៌ទឹកក្រូចនៅក្នុងពេលអ្នកលេប ថ្នាំនេះ។ វាជាការធម្មតាទេ ហើយមិនធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចសរីរាង្គរបស់អ្នកទេ ។ ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកពាក់កែវភ្នែកវាអាចធ្វើឲ្យកែវភ្នែកមានដាមជាប់ពណ៌ ទឹកក្រូចជាប់កែវផង ។

ប្រាប់ទៅគ្រូពេទ្យឬក៏គិលានុដ្ឋយិកាជាបន្ទាន់បើសិនជាអ្នកកំពុងលេប ថ្នាំរៀបនិងចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំមុខខាងក្រោមនេះ នៅក្នុងពេល ជាមួយដែលអ្នកលេបថ្នាំ **RIFAMATE** :

- ថ្នាំ **ANTABUSE** (ថ្នាំបញ្ឈប់ជីកសុរា)

- ថ្នាំ **DILANTIN** (ថ្នាំសម្រាប់បញ្ឈប់ប្រកាច់នឹងភ្នែក)

- ថ្នាំគ្រាប់ការពារមិនឲ្យមានកូន, ទាំងថ្នាំចាក់ថ្នាំសិកតាមដៃ

- ថ្នាំបញ្ឈប់ប្រើគ្រឿងញាណ

- ថ្នាំ **THEOPHYLLINE** សម្រាប់ព្យាបាលសួត

- ថ្នាំសំរាប់បេះដូង, ឈាម, និងថ្នាំសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែម,

ថ្នាំវិលាបការឈឺចាប់ ឬ ក៏ថ្នាំវិលាបចិត្ត

ថ្នាំ PYRAZINAMIDE (ជាយ៉ាស៊ីណាមីត)

ប្រតិកម្មរបស់ថ្នាំ PYRAZINAMIDE

ដែលត្រូវសង្កេតមើលថែមទៀតក្នុងខណៈលេបថ្នាំនេះ ។

- ឈឺ ឬហើម តាមសន្ទាក់
- មានការពិបាក ក្នុងការបត់ជើងភ្លាមៗ

ថ្នាំនេះអាចលេបជាមួយថ្នាំដទៃទៀត ដោយគ្មានបញ្ហាទេ

ថ្នាំ ETHAMBUTOL (អ៊ីតាំប៊ូតុល)

ប្រតិកម្មរបស់ថ្នាំ ETHAMBUTOL ត្រូវសង្កេតមើល

ថែមទៀតក្នុងខណៈលេបថ្នាំនេះ

- ស្រវាំងភ្នែក ធ្វើឲ្យពិបាកពេលមើលអក្សរ
- មើលពណ៌ក្រហម ឬ បៃតងមិនច្បាស់
- ឈឺ ឬហើម តាមសន្ទាក់

ថ្នាំ ETHAMBUTOL អាចធ្វើឲ្យស្រវាំងភ្នែក ។

ត្រូវព្យាយាមពិនិត្យមើលភ្នែករបស់អ្នកនៅមុនពេលលេបថ្នាំនេះហើយនិងនៅពេលអ្នកកំពុងលេបថ្នាំនេះជាមួយនិងការណាត់ជួបផងដែរនោះ ។

ថ្នាំនេះអាចលេបជាមួយថ្នាំដទៃទៀតដោយគ្មានបញ្ហាទេ

ថ្នាំព្យាបាលរោគរបេងដែលត្រូវព្យាបាល ចេញឲ្យអ្នក

- ISONIAZID _____ mg _____ ក្រាប់
(រោយស្តណាយស៊ីត) ១ថ្ងៃ
- RIFAMPIN _____ mg _____ ក្រាប់មូលទ្រវែង
(វ៉ាយហ្វាមីតិន) ១ថ្ងៃ
- RIFAMATE _____ mg _____ ក្រាប់មូលទ្រវែង
(វ៉ាយហ្វាមេត) ១ថ្ងៃ
- PYRAZINAMIDE _____ mg _____ ក្រាប់
(ជាយ៉ាស៊ីណាមីត) ១ថ្ងៃ
- ETHAMBUTOL _____ mg _____ ក្រាប់
(អ៊ីតាំប៊ូតុល) ១ថ្ងៃ

ជាការចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវលេបថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺរបេងទាំងអស់ដែលត្រូវព្យាបាលទោះបីជាអ្នកមិនឈឺក៏ដោយ។ បើអ្នកមានអាការៈរោគដូចខាងក្រោមនេះទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬ គិលានុបដ្ឋយិកា ឬ គិលានុបដ្ឋានជាបន្ទាន់ កុំរង់ចាំរហូតដល់ពេល ណាត់ជួបបេឡេក្រោយទៀតឲ្យសោះ ។

អាការៈរោគទាំងអស់នោះគឺ :

- * ស្បែកមានពណ៌លឿង * ចេញកន្ទួលឬរមាស់
- * រមួលពោះ ឬ ក្អួត * ទឹកនោមមានពណ៌ក្រមៅ
- * លាមកមានពណ៌, ស, ពេះ, ប្រពេះ, ឬដាំដែល * ក្តៅខ្លួន
- * អស់កម្លាំង ឬ ខ្សោយខុសពីធម្មតា

ទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬ គិលានុបដ្ឋយិកា ឬ គិលានុបដ្ឋានជាបន្ទាន់ :

- កុំលេបបេឡេក្រោយថ្នាំ
- អ្នកជៀសវាងមិនអាចលេបបានទេ
- ទុកឲ្យផុតពីដេក្រែង
- អ្នកចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំថ្មី
- អ្នកចាប់ផ្តើមផឹកស្រា, ប៊ឺរ, ឬគ្រឿងស្រវឹងដទៃទៀតភ្លាមៗ
- អ្នកដឹងខ្លួនថាអ្នកមានវិញនោះ
- ក្អកខ្លួន, ក្តៅខ្លួន , ឬ ស្រកទម្ងន់