


NSW SEXUAL HEALTH SERVICES
 Providing free and confidential
 sexual health care.

콘돔 사용법

1. 사전에 당신의 성 행위 파트너에게 콘돔 사용에 대해 이야기할 것.
2. 콘돔 포장 뒷면에 나와 있는 "유효 기간"을 체크 확인할 것.
3. 사전에 콘돔 사용을 연습해볼 것. 콘돔 크기와 편안함을 위하여 여러 종류를 시도해 볼 것.
4. 성 행위 접촉 이전에 콘돔을 끼울 것. 반지나 손톱으로 콘돔을 파손시키지 말 것.
5. 콘돔을 음경 베이스 끝까지 말아 올릴 것.
6. 성교후 성기를 빨 때 콘돔 테두리를 잡을 것.
7. 케이 와이 젤리 (KY Jelly) 또는 웰 스타프 (Wet Stuff) 같은 수성 윤활제를 사용할 것. (고무를 상하게 하는) 바젤린이나 베이비 오일 같은 유성 윤활제를 사용하지 말 것.
8. 사용한 콘돔은 변기에 넣지 말고 쓰레기통에 버릴 것.



도표는 에이즈 국가 자문 위원회 제공

Albury	Ph: (02) 6058 1831
Balranald	Ph: (03) 5027 2345
Bourke	Ph: (02) 68722145
Broken Hill	Ph: (08) 8088 5800
Canterbury	Ph: (02) 9718 7655
Coffs Harbour	Ph: (02) 6659 1916
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3470
Katoomba	Ph: (02) 4780 6060
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 68291022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6361 9906
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4724 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6551 1315
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

**음부 이
 (사면발이)**

Pubic Lice (Crabs)

**SYDNEY
 SEXUAL
 HEALTH
 CENTRE**

시드니 대학교 / 뉴 사우스 웨일스 대학교
 성(性) 보건 의학부 분과

음부 이는 인체 다른 부분뿐 아니라 음부에 근질근질한 가려움증을 일으킬 수 있는 기생충(조그만 곤충 같은 동물)이다.

어떻게 감염되는가?

음부 이는 감염된 사람과 밀접한 육체 접촉 관계를 가짐으로써 옮겨진다. 이는 인체를 떠나서도 어느 정도의 시간동안 살 수 있기 때문에 타올, 의복 또는 남의 침대를, 사용함으로써 걸릴 수도 있다.

음모에 기생하는 이는 머리털에서 볼 수 있는 것과 같은 기생충인가?

아니다. 음모에 기생하는 이는 머리털에서 볼 수 있는 기생충과는 다르다. 후자는 수염, 겨드랑이 털, 가슴 털과 눈썹에서도 발견될 수 있다.

치료법은 무엇인가?

로션 머리 이 약을 머리부터 발톱까지 바르고 하루 밤 있다가 씻어 버릴 것. 이 방법을 7일 동안 매일 반복할 것. 또한 감염된 부위에 직접 닿았던 의복과 침대보를 바꾸고 세탁한 필요

요가 있다. 보통의 뜨거운 물로 세탁하는 것으로 족하다. 가려운 증세가 치료 후에 계속 남아 있을 수 있다. 이 증세가 2주 이상 계속되면 이것은 알레르기성 반작용이나 이가 소멸되지 않은 상태에 기인할 수 있다. 따라서 이 경우에는 의사의 지시를 받아야 한다.

아무나 이런 치료를 받을 수 있는가?

어린아이, 임산부와 젖을 먹이는 어머니는 머리 이 치료 방법을 사용해서는 안된다. 피부가 민감한 사람이나 피부가 터진 사람은 머리 이 치료 방법을 사용하지 말 것이다. 그 대안 치료 방법을 의사와 상의해야 한다.

성 행위 파트너가 치료받을 필요가 있는가?

감염된 사람과 밀접한 육체 접촉을 가졌던 사람은 이가 옮았을 우려가 있으므로 역시 치료를 받아야 한다.

감염된 사람과 같이 집/플랫, 아파트를 함께 쓰는 사람은 치료를 받아야 하는가?

이런 사람들은 만약 감염된 사람의 침대에서 잤거나 타올이나 의복을 사용한 경우에만 치료받을 필요가 있다.

