



# ការប្រើស្រោមលិង

## NSW SEXUAL HEALTH SERVICES Providing free and confidential sexual health care.


១. ចូរអ្នកពិគ្រោះជាមួយគូស្នេហាជាមុន អំពី ការប្រើស្រោមលិង។




២. ចូរពិនិត្យនៅលើកញ្ចប់ មើលថ្ងៃខែដែល ស្រោមលិងត្រូវទូច ប្រើមិនបាន។




៣. ចូរសាកល្បងប្រើស្រោមលិងជាមុន។ ចូរ សាកម៉ាកផ្សេងៗ ជ្រើសរើសរកទំហំ អោយបានត្រឹមត្រូវ។




៤. ចូរពាក់ស្រោមលិង មុននឹងសេពកាម។ ប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកដាច់រំហែក ដោយសារ ចិញ្ចៀន វីក៏ក្រចកដែរ។



៥. ចូរច្នៃស្រោមអោយទៅដល់គល់លិង។




៦. ចូរកាត់ទប់គល់ស្រោម នៅពេលដែល អ្នកដកលិងចេញពីយោនី ។



៧. ចូរប្រើធាតុរំលិលដែលមានជាតិទឹក ដូចជា ម៉ាក យីចេល្លី វីក៏វេតស្តារ។ ជៀសវាងកុំ ប្រើធាតុរំលិលដែលមានជាតិប្រេង ដូចជា ខ្នាញ់វ៉ាសាលីន វីក៏ប្រេងទារក(ជាតិប្រេង នេះ ធ្វើអោយទូចស្រោមកៅស៊ូ) ។

៨. ចូរចោលស្រោមលិងក្នុងធុងសំរាម កុំចោលក្នុងបង្គន់។



គំនូរនេះផ្តល់ដោយ គណៈកម្មការជាតិទីព្រឹក្សា ទាំងជំនីរគោរ។

Albury	Ph: (02) 6058 1831
Balranald	Ph: (03) 5027 2345
Bourke	Ph: (02) 68722145
Broken Hill	Ph: (08) 8088 5800
Canterbury	Ph: (02) 9718 7655
Coffs Harbour	Ph: (02) 6659 1916
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3470
Katoomba	Ph: (02) 4780 6060
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 68291022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6361 9906
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4724 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6551 1315
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

## រោគស្វាយប្រម៉េះ Syphilis



និង ផ្នែកសិក្សានៃវេជ្ជសាស្ត្រទាំងសុខភាពនៃការសេពកាម សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី/សាកលវិទ្យាល័យញ៉ូសោធរស

### តើគេអាចឆ្លងរោគនេះតាមបែបណា?

ជាធម្មតា រោគស្វាយប្រម៉ែឆ្លងតាមរយៈការសេពកាម តាមយោនី កូថ រីក៍តាមមាត់ ដោយមិនប្រើស្រោម លីង ជាមួយអ្នកដែលមានជំងឺនេះ។ រោគនេះអាចឆ្លង នៅពេលមានផ្ទៃពោះ ពីស្ត្រីដែលមានរោគទៅទារក ដែលកំពុងចាប់កំណើតក្នុងពោះ។

### តើរោគសញ្ញាមានអ្វីខ្លះ?

ក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ដំបៅខ្លះលេចចេញនៅត្រង់ដែល មានរោគប្រមាណជា១០ទៅ៤០ថ្ងៃក្រោយពេលចំលង។ ធម្មតា ដំបៅនេះមិនធ្វើអោយឈឺចាប់ទេ ហើយដោយ សារដំបៅនេះមានទំហំតូចដល់ធំ ជួនកាលគេមិនទាំង ដឹងចាប់អារម្មណ៍ផងទេ។ ដំបៅនេះជាសះទៅវិញ ក្នុង រយៈពេលពី២ទៅ៦អាទិត្យ។ ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃរោគ ស្វាយ កកើតឡើងក្នុងចន្លោះពេលពី ៧ទៅ១០អាទិត្យ ក្រោយពេលឆ្លងជាដំបូង។ ក្នុងរយៈពេលនេះ គេនឹង មិនស្រួលខ្លួន ដោយមានអាការរោគដូចជាផ្កាសាយ ហើយមានកន្ទួលរោលពេញខ្លួន ទាំងបាតដៃ បាតជើង និងមុខមាត់ផងដែរ។ ធម្មតា រោគសញ្ញាទាំងនេះមិន ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយឆាប់បាត់រាបទៅវិញ ម្ល៉ោះហើយគេមិន ទាំងដឹងចាប់អារម្មណ៍ផងទេ។ បន្ទាប់មក មេរោគស្វាយនឹងនៅសំងំ។ ក្នុងពេលសំងំ នេះ គេពុំឃើញមានអាការរោគអ្វីទេ ហើយមេរោគនេះ អាចនៅសំងំយ៉ាងនេះបានរាប់ឆ្នាំ រីមួយជីវិត។ ក្នុងរយៈ

ពេលពី៥ទៅ៣៥ឆ្នាំក្រោយមក អ្នកជំងឺខ្លះអាចនឹងចូល ទៅដល់ដំណាក់កាលទី៣ ដែលរោគស្វាយនេះនឹងធ្វើ អោយខូចសរីរាង្គ មានដូចជាខួរក្បាល ជួរឆ្អឹងខ្នង និងបេះដូង។

### តើគេមានកិច្ចព្យាបាលដែររឺទេ?

នៅពេលដែលគេពិនិត្យដឹងថាជារោគស្វាយហើយនោះ គេអាចព្យាបាលរោគនេះបានយ៉ាងងាយ ដោយការចាក់ វីលេបថ្នាំអ៊ីនទីបាម៉ូស៊ីក។ រយៈពេលនៃការព្យាបាល នេះនឹងយោលទៅតាមដំណាក់កាលនៃជំងឺ ដែលអាច ត្រូវការពេលពី១០ទៅ៣០ថ្ងៃ។

### តើគួរសេពកាមត្រូវទទួល

### ការព្យាបាលដែររឺទេ?

នេះនឹងយោលទៅលើដំណាក់កាលនៃជំងឺ និងរបៀប ឆ្លង។ លោកគ្រូពេទ្យនឹងពិគ្រោះអំពីបញ្ហានេះ។

### តើគេអាចអោយអាវាទណាខ្លះទៅ

### អ្នកកើតរោគស្វាយនេះ?

- ព្យាបាលអោយចប់កម្មវិធីត្រឹមត្រូវ។
- អាការរោគបែបផ្កាសាយ ជាប្រតិកម្មធម្មតា ក្នុង កំលុងថ្ងៃដំបូងនៃកម្មវិធីព្យាបាល។ អាការរោគទាំង

នេះ ពុំមានន័យថា អ្នកជំងឺមានប្រតិកម្មពីថ្នាំអ៊ីនទី បាម៉ូស៊ីកនោះឡើយ

- ប្រសិនបើគេចេញជាកន្ទួលរោលពេញខ្លួន រឺក៏មាន រោគសញ្ញាផ្សេងទៀត ក្រោយពីថ្ងៃទីមួយនៃកម្មវិធី ព្យាបាល គេគួរតែប្រាប់គ្រូពេទ្យអោយដឹង។ រោគ សញ្ញាទាំងនេះអាចគេដឹងអំពីប្រតិកម្មរបស់ថ្នាំ។
- ក្រោយពីការព្យាបាលបានចប់សព្វគ្រប់ហើយ គេ នឹងស្នើសុំអោយអ្នកជំងឺយកឈាមទៅបំបែកវិភាគ ពិនិត្យមើល។ គេចង់អោយច្បាស់ថា ការព្យាបាល ជំងឺនេះបានជោគជ័យហើយ។
- ធម្មតា គេអាចអនុញ្ញាតអោយសេពកាមឡើងវិញ ក្រោយពីអាទិត្យទីមួយនៃការព្យាបាល។ ចូរសួរ គ្រូពេទ្យ។

### តើការបំបែកវិភាគឈាមក្រោយពេល ព្យាបាលនឹងចេញលទ្ធផលជាអេហ្គាទីវ (Negative) បន្ទាប់ពីកម្មវិធីព្យាបាល?

គេបានដឹងថា អ្នកជំងឺណាម្នាក់កើតរោគស្វាយ ដោយ សារ ការបកស្រាយការបំបែកវិភាគធាតុប្រឆាំងប្រចាំ កាយមួយចំនួន ដែលគេធ្វើឡើងដោយយកឈាមតែ ម្តងទៅមើល។ ធម្មតា ការបំបែកវិភាគពីរដងបែបនេះ នឹងចេញជាលទ្ធផលថ្មីស៊ីទីវីមួយជីវិត។ គេស្តាយ ដោយធាតុប្រឆាំងប្រចាំកាយទាំងនោះ ពុំអាចការពារ មិនអោយរោគស្វាយ នេះកកើតឡើងវិញបាន។