


## 콘돔 사용법

## NSW SEXUAL HEALTH SERVICES

Providing free and confidential sexual health care.

1. 사전에 당신의 성 행위 파트너에게 콘돔 사용에 대해 이야기할 것.
2. 콘돔 포장 뒷면에 나와 있는 "유효 기간"을 체크 확인할 것.
3. 사전에 콘돔 사용을 연습해볼 것. 콘돔 크기와 편안함을 위하여 여러 종류를 시도해 볼 것.
4. 성 행위 접촉 이전에 콘돔을 끼울 것. 반지나 손톱으로 콘돔을 파손시키지 말 것.
5. 콘돔을 음경 베이스 끝까지 말아 올릴 것.
6. 성교후 성기를 빨 때 콘돔 테두리를 잡을 것.
7. 케이 와이 젤리 (KY Jelly) 또는 웨트 스타프 (Wet Stuff)같은 수성 윤활제를 사용할 것. (고무를 상하게 하는) 바젤린이나 베이비 오일 같은 유성 윤활제를 사용하지 말 것.
8. 사용한 콘돔은 변기에 넣지 말고 쓰레기통에 버릴 것.



도포는 에이즈 국가 자문 위원회 제공

Albury	Ph: (02) 6058 1831
Balranald	Ph: (03) 5027 2345
Bourke	Ph: (02) 68722145
Broken Hill	Ph: (08) 8088 5800
Canterbury	Ph: (02) 9718 7655
Coffs Harbour	Ph: (02) 6659 1916
Dubbo	Ph: (02) 6885 1700
Forster	Ph: (02) 6555 6822
Gosford	Ph: (02) 4320 2114
Goulburn	Ph: (02) 4827 3470
Katoomba	Ph: (02) 4780 6060
Kings Cross	Ph: (02) 9360 2766
Kogarah	Ph: (02) 9350 2742
Lightning Ridge	Ph: (02) 68291022
Lismore	Ph: (02) 6620 2980
Liverpool	Ph: (02) 9827 8022
Manly	Ph: (02) 9977 3288
Marrickville	Ph: (02) 9560 3057
Newcastle	Ph: (02) 4923 6909
Nowra	Ph: (02) 4423 9353
Orange	Ph: (02) 6361 9906
Parramatta	Ph: (02) 9843 3124
Penrith	Ph: (02) 4724 2507
Port Kembla	Ph: (02) 4276 2399
Richmond	Ph: (02) 4578 1622
St Leonards	Ph: (02) 9926 7414
Sydney City	Ph: (02) 9382 7440
Tamworth	Ph: (02) 6766 3095
Taree	Ph: (02) 6551 1315
Wagga Wagga	Ph: (02) 6938 6492

## 매독

### Syphilis

## SYDNEY SEXUAL HEALTH CENTRE

시드니 대학교 / 뉴 사우스 웨일스 대학교  
성(性) 보건 의학부 분과

## 어떻게 감염되는가?

매독은 보통 보균자와 콘돔을 사용하지 않고 않고 버자이널(음질 접촉) 또는 오랄(성기와 입 접촉) 성교를 할 때 감염된다. 이는 또한 임신 도중 감염된 모체로부터 자라나는 태아에게 전염될 수 있다.

## 증상은 무엇인가?

매독 제1기에는 감염 후 대략 10~90일 사이에 감염된 부위에 경성하감(硬性下疳)이 나타난다. 이 피부병은 일반적으로 통증이 없고 크기가 (작은 찰상(擦傷)에서부터 큰 종기까지) 다양하기 때문에 흔히 잘 모르고 지나칠 수 있다. 경성하감은 2~6주 사이에 자동적으로 치유된다. 처음 감염된 후 대략 7~10주 사이에 제2기 매독이 발생한다. 이 기간동안 보균자는 감기 같은 증상과 손바닥, 발바닥 또는 얼굴을 포함하여 전신에 발진이 생김으로써 몸이 편하지 않게 된다. 이러한 증상들은 보통으로 가볍고 일시적이며 재차 모르고 지나칠 수 있다.

그 다음 이 감염은 잠복된다. 잠복기 매독에는 아무런 신체적 증상이 없고, 감염은 수년에서 평생까지 이 단계로 남아 있을 수 있다. 5년에서 35년 사이 후에 어떤 보균자는 제3기 매독이 발생한다. 이 제3기 매독은 뇌, 척추 및 심장을 포함하여 어느 내장이 손상된 결과이다.

## 치료법이 있는가?

발견만 되면 매독은 항생 주사나 정제 항생제로써 비교적 쉽게 치료된다. 치료 기간은 몇 기 감염 상태에 있느냐에 달려 있으며 10일에서 30일 사이 범위이다.

## 성 행위 파트너도 치료받을 필요가 있는가?

이에 대한 대답은 몇 기 감염 상태에 있고 어떻게 감염되었지에 달려 있다. 이런 점들은 의사가 상의할 것이다.

## 매독 환자가 알아야 할 중요 사항은 무엇인가?

- 치료를 끝까지 완결함을 명심할 것.
- 감기 같은 증상은 치료 초기 동안에는 정상적인 반응이다. 이런 증상은 환자가 항생제에 대한 알레르기가 있다는 뜻이 아니다.
- 치료받은 첫날 후에 몸에 발진이나 어떤 다른 증상이 나타나면 환자는 간호원이나 의사에게 알려야 한다. 이런 증상은 치료에 대한 알레르기성 반응이 있다는 암시일 수 있다.

- 치료가 완결되자마자 후속 피 검사 받을 것을 추천한다. 이로써 감염이 완전히 치료되었는지를 확실하게 하는 것이다.
- 성교는 치료 첫 주 후에는 보통으로 괜찮다 의사나 간호원에게 문의할 것.

## 치료가 완결된 후 후속 피 검사 결과는 음성일 것인가?

매독 진단은 한 혈액 샘플에 여러 항체 검사를 하여 그 결과를 해석함으로써 이루어진다. 이 검사들 중 두 검사 결과는 보통 평생토록 양성으로 남게 된다. 불행히도 이들 항체는 매독 재 감염 가능성에 대한 방어력이 없다.

