

វិធីផ្សេងៗសំរាប់ការការពារកុំឲ្យមានផ្ទះពោះ

Ways to prevent pregnancy

ជារៀងរាល់ខែ អណ្តាស័យ (woman's ovaries) របស់ស្ត្រីបញ្ចេញពងកោសិកាមួយ (an egg)។ ការមានផ្ទៃពោះនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលទឹកកាមបុរស ជួបពងកោសិការបស់ស្ត្រីនៅពេលរួមកាមតណ្ហា។ គេមានរបៀបសំរាប់ការការពារកុំឲ្យមានកូន។ ខាងក្រោមនេះជាការពិតស្តីពីវិធីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី សំរាប់ការការពារកុំឲ្យមានកូន។ បើចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសូមទាក់ទងទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក, មណ្ឌលសុខភាពស្ត្រី(women's health centre), “មណ្ឌលគម្រោងការណ៍គ្រួសារ” (FPA Health Centre) ឬមណ្ឌល FPA Health Multicultural Services (ទូរស័ព្ទ 02 9754 1322)។ ការសួរសេវាទាំងនេះ ពីផលប្រយោជន៍, ភាពធ្វើទុក្ខ, គ្រោះថ្នាក់ និងពិតមែនឬទេផ្សេងៗសំរាប់កុំឲ្យមានកូន និងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសវិធីណាមួយដែលល្អបំផុតសំរាប់ខ្លួនអ្នក។

ថ្នាំលេបសំរាប់កុំឲ្យមានកូនហៅ ភីល Pills

- **ភីលម្យ៉ាងហៅ The Combined Pill**
ភីលម្យ៉ាងហៅ The Combined Pill នេះមានជាតិអ័រម៉ូន(hormones) ២យ៉ាង ដែលបញ្ឈប់អណ្តាស័យកុំឲ្យធ្វើពងកោសិកា។ ភីលនេះងាយស្រួលប្រើ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែញ៉ាំភីលនេះឲ្យបានទៀងទាត់។ បើប្រើត្រឹមត្រូវ ភាពបានសាកសិទ្ធិមានច្រើនជាង ៩៧ភាគរយ។ វាមិនបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាដល់ភាពមានកូនទេ បើកាលណាអ្នកចង់បានកូនទៅថ្ងៃក្រោយ។ ភីលនេះកម្រធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ តែការជក់បារីរឹតតែបណ្តាលឲ្យកើនឡើងគ្រោះថ្នាក់។
- **ភីលម្យ៉ាងហៅ The Mini Pill**
ភីលម្យ៉ាងហៅ The Mini Pill នេះត្រូវតែញ៉ាំឲ្យបានទៀងទាត់ (នៅម៉្តងម៉្តងប្រហែលគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃ) បើមិនដូច្នោះទេ វាមិនអាចការពារមិនឲ្យមានកូន។ ភីលនេះមិនសូវសាកសិទ្ធិដូចភីលម្យ៉ាងហៅ The Combined Pill ទេ ក៏ប៉ុន្តែគេច្រើនស្នើសុំសំរាប់ឲ្យស្ត្រីណាដែលបញ្ហាសុខភាព ហើយនិងស្ត្រីដែលបំបៅដោះកូន។
- **វិធីការពារកុំឲ្យមានកូនពេលអាសន្ន**
ប្រសិនបើអ្នកបានរួមកាមតណ្ហាហើយគួនប្រើវិធីការពារ ឬផ្លាយស្រោមលើក្នុង ការញ៉ាំភីលម្យ៉ាងសំរាប់ពេលអាសន្ននេះអាចជួយការពារកុំឲ្យមានកូន។ អ្នកត្រូវតែចាប់ញ៉ាំភីលនេះក្នុងរយៈពេល៧២ម៉្តងចាប់ពីពេលរួមកាមតណ្ហាដែលគ្មានវិធីការពារ។ ដូចភីលកុំឲ្យមានកូនដទៃទៀតដែរ អ្នកត្រូវការសំបុត្រពីវេជ្ជបណ្ឌិតសំរាប់ទិញថ្នាំនោះ។

ថ្នាំបាក់ម្យ៉ាងហៅ Depo Provera

ថ្នាំបាក់ម្យ៉ាងហៅ Depo Provera នេះគឺជាថ្នាំបាក់អូវុល ដែលត្រូវបាក់២អាទិត្យម្តងដើម្បីកុំឲ្យស្ត្រីបញ្ចេញ ពងកោសិកា។ ថ្នាំបាក់នេះមានភាពសាកសិទ្ធជាង ៩៩ភាគរយ ហើយជាការល្អចំពោះអ្នកណាដែលចេះតែ ភ្លេច។ ភាពមិនល្អគឺការធ្លាក់ឈាមមិនទៀងទាត់។ វាក៏អាចបណ្តាលឲ្យអស់ពេលជាច្រើនខែដែរ ទម្រាំអ្នក មានផ្ទៃពោះ ក្រោយពីការបាក់ថ្នាំនោះចុងក្រោយ។

ការបណ្តុះជាតិម្យ៉ាងក្នុងស្បែកសំរាប់កុំឲ្យមានកូនហៅ Contraceptive skin implant

ការបណ្តុះជាតិម្យ៉ាងក្នុងស្បែកសំរាប់កុំឲ្យមានកូនហៅ Contraceptive skin implant នេះគឺជាវិធីមួយ ដែលវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ចូលដំបូលស្លឹកតូចមួយ(a tiny plastic rod) ចូលទៅក្នុងស្បែកដៃ។ វាមានជាតិអូវុល សំរាប់បញ្ឈប់កុំឲ្យស្ត្រីធ្វើពងកោសិកា។ វាមានប្រសិទ្ធភាព ៩៩.៧ ភាគរយ ហើយងាយស្រួល (ត្រូវការប្តូរ ៣ឆ្នាំម្តង)។ ការធ្វើទុក្ខមានរួមទាំងការធ្លាក់ឈាមមិនទៀងទាត់ ឬការផ្តាស់ប្តូររដូវ។ វិធីនេះមានជូននៅតាម មណ្ឌល FPA Health Centre និងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្លះ។

កងម្យ៉ាងហៅ The Copper IUD (intrauterine device)

កង The Copper IUD នេះជាប្លាស្ទិកតូចមួយនិងវត្ថុជាតិស្ពាន់ ដែលវេជ្ជបណ្ឌិតដាក់ទៅក្នុងស្បូន។ វាមាន ប្រសិទ្ធភាពប្រហែល ៩៨ភាគរយ ហើយអាចដាក់នៅក្នុងស្បូននោះពី៥ ទៅ៨ឆ្នាំ។ ការចាញ់ប្រៀបមានរួម ទាំងការធ្លាក់រដូវខ្លាំង ហើយឈឺជាង។ វាអាចបង្កើននូវគ្រោះថ្នាក់នៃការរលាកក្នុងស្បូន ដែលក្លាយលឿន ជាងអ្នកដែលគ្មានដាក់ IUD ។

កងម្យ៉ាងហៅ The Hormonal IUD

កង The Hormonal IUD នេះថ្លៃជាងកង The Copper IUD ក៏ប៉ុន្តែវាផ្តល់ផលជាង ជៀសជាងការ ធ្លាក់ច្រើន។ កង The Hormonal IUD នេះដាក់បានលើស៥ឆ្នាំ ហើយមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាង ៩៩ ភាគរយ។

ស្រោមលិង្គ

ការប្រើត្រីមត្រូវ វាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ ហើយវាជួយការពារមិនឲ្យឆ្លងជម្ងឺផ្សេងៗរួមទាំងមេរោគ HIV ដែលជាមេរោគអាចបណ្តាលឲ្យកើតជម្ងឺអេដស៍(AIDS)។ ស្រោមលិង្គមួយ អ្នកអាចប្រើតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។

- **ស្រោមលិង្គបុរស Male condom**
ស្រោមលិង្គបុរស គឺជាជាតិកៅស៊ូស្តើង ដាក់ពាក់នៅពេលក្តីខឹង ដើម្បីការពារមិនឲ្យទឹកកាមចូល ទៅក្នុងយោនី(ទ្វារមាសស្ត្រី)។ ចូរប្រើជាមួយទឹករំលាយម្យ៉ាងហៅ water-based lubricant (កុំប្រើ ជាមួយ jelly) ដើម្បីជួយកុំឲ្យរហែក។
- **ស្រោមលិង្គស្ត្រី Female condom**
ស្រោមលិង្គស្ត្រី មានលំដាប់ធ្វើជាស្រទាប់នៅលើយោនី ដើម្បីការពារមិនឲ្យទឹកកាមបុរសចូលក្នុង ស្បូន។ មានផ្តល់ជូននៅតាមមណ្ឌល FPA Health Centre និងមណ្ឌលសុខភាពផ្នែកកាម Sexual Health Centre ប៉ុណ្ណោះ។

ម្ហូបពិសេសម្យ៉ាងហៅ Diaphragms and caps

ម្ហូបពិសេសម្យ៉ាងហៅ Diaphragms and caps នេះធ្វើពីកៅស៊ូស្តើងទន់ ដែលដាក់ពាក់ទៅក្នុងស្បូន ដើម្បីគ្របកស្បូន (ផ្លូវចូលទៅក្នុងស្បូន)។ វាបញ្ឈប់មិនឲ្យទឹកកាមបុរសចូលទៅក្នុងស្បូន។ វត្ថុនេះត្រូវតែ ដាក់ត្រឹមត្រូវដោយបុគ្គលិកឯកទេសសុខភាព។ អ្នកអាចដាក់ម្ហូបពិសេសម្យ៉ាងហៅ Diaphragms and caps នេះ ២៨ម៉ោងមុនពេលរួមកាមតណ្ហា ហើយយកចេញ៦ម៉ោងក្រោយមក។ មិនមានប្រសិទ្ធិភាពដូច វិធីដទៃទៀតទេ ប៉ុន្តែក៏មិនសូវធ្វើទុក្ខប្រយោជន៍គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដែរ។

វិធីវះកាត់ម្យ៉ាងហៅ Sterilisation

ទាំងបុរស ឬស្ត្រីអាចមានការវះកាត់ ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានកូនជាអចិន្ត្រៃយ៍ ។ វិធីវះកាត់ម្យ៉ាងហៅថា Sterilisation នេះជាការវះកាត់ងាយស្រួលហើយផុតគ្រោះថ្នាក់ជាងសំរាប់បុរស បើប្រៀបទៅនឹងស្ត្រី។ វិធី នេះ គឺសំរាប់ជនណាដែលមានកូនគ្រប់គ្រាន់ហើយ។

ប្រសិនបើអ្នកមានការពិបាកក្នុងការទូរស័ព្ទជាភាសាអង់គ្លេស សុំអ្នកទាក់ទងទៅផ្នែកផ្តល់អ្នកបកប្រែ Translating and Interpreting Service (អក្សរកាត់ TIS) លេខ 131 450។

អ្នកអាចយកព័ត៌មានផ្នែកសុខភាពបន្ថែមទៀតជាភាសាខ្មែរ ពីកំព្យូទ័រតាមរយៈ **Multicultural Communication website at <<http://mhcs.health.nsw.gov.au>**

លេខទូរស័ព្ទទាំងនេះត្រឹមត្រូវនៅពេលបោះពុម្ព ក៏ប៉ុន្តែអាចមិនបានកែតម្រូវឲ្យទាន់កាលៈទេសៈ។ លោក- អ្នក ប្រហែលអាចត្រូវមើលបញ្ជាក់លេខនៅក្នុង“សៀវភៅទូរស័ព្ទ”(Telephone Directory)។